

Capitolul 2

ȘIRURI DE NUMERE REALE

2.1 Proprietăți generale

Fie $A \neq \emptyset$ o mulțime dată. Se numește *șir de elemente din A* o funcție $f : \mathbb{N} \rightarrow A$. Dacă $A = \mathbb{R}$, șirul respectiv se va numi *șir de numere reale*, *șir numeric* sau, mai simplu, *șir*. Fiind dat un șir $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, se vor numi *termeni ai șirului* numerele $f(0), f(1), f(2), \dots$, notate de obicei cu ajutorul unui indice sub forma

$$f(0) = x_0, f(1) = x_1, f(2) = x_2, \dots, f(n) = x_n, \dots,$$

x_n numindu-se *termenul general al șirului*, sau *termenul de rang n*. Un șir cu termenul general x_n se va nota și $(x_n)_{n \geq 0}$. Dacă primii k termeni x_0, x_1, \dots, x_{k-1} nu sunt definiți (ceea ce corespunde unei funcții $f : \{k, k+1, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$), vom nota șirul sub forma $(x_n)_{n \geq k}$.

2.1.1 Moduri de definire a unui șir

Un șir poate fi definit precizând formula termenului general, prin intermediul unei recurențe sau în mod descriptiv.

Exemple. Șiruri definite prin formula termenului general:

$$(x_n)_{n \geq 0} : x_n = 3n + 1; \quad x_0 = 1, x_1 = 4, x_2 = 7, \dots$$

$$(x_n)_{n \geq 0} : x_n = \begin{cases} 1, & \text{dacă } n \text{ par} \\ 0, & \text{dacă } n \text{ impar} \end{cases}; \quad x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = 1, \dots$$

Șiruri definite prin intermediul unei recurențe

Dacă pentru un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ se cunosc primii k termeni x_0, x_1, \dots, x_{k-1} , fiind dată de asemenea o relație prin care termenul general x_n se exprimă în funcție de $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}$ pentru orice $n \geq k$, se spune că $(x_n)_{n \geq 0}$ este definit printr-o *recurență de ordinul k* .

Șiruri definite în mod descriptiv.

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$, $x_n =$ aproximarea prin lipsa cu n zecimale exacte a lui $\sqrt{2}$ este definit în mod descriptiv. Se obține că $x_1 = 1.4$, $x_2 = 1.41$, $x_3 = 1.414$, ș.a.m.d.

Progresii aritmetice

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin recurența de ordinul întâi dată de

$$x_0 = a \text{ și } x_{n+1} = x_n + r, \quad n \geq 0,$$

a și $r \in \mathbb{R}$ fiind date, se numește *progresie aritmetică*, r numindu-se *rația progresiei* (din orice termen al șirului se obține termenul care-l succede prin adăugirea rației). Se obține că formula termenului general este $x_n = a + nr$, $n \geq 0$, iar $x_m = x_n + (m - n)r$, $m, n \geq 0$. De asemenea, suma primilor $n + 1$ termeni este

$$\begin{aligned} S_n &= x_0 + x_1 + \dots + x_n \\ &= a + (a + r) + \dots + (a + nr) \\ &= (n + 1)a + (r + 2r + \dots + nr) \\ &= (n + 1)a + \frac{n(n + 1)}{2}r. \end{aligned}$$

Din cele de mai sus, se observă și că

$$S_n = \frac{n(a_0 + a_n)}{2}.$$

Progresii geometrice

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin recurența de ordinul întâi dată de

$$x_0 = b \text{ și } x_{n+1} = x_n q, \quad n \geq 0,$$

b și $q \in \mathbb{R}$ fiind date, se numește *progresie geometrică*, q numindu-se *rația progresiei* (din orice termen al șirului se obține termenul care-l succede prin înmulțirea cu

rația). Se obține că formula termenului general este $x_n = bq^n$, $n \geq 0$, iar $x_m = x_n q^{m-n}$, $m, n \geq 0$. De asemenea, suma primilor $n + 1$ termeni este

$$\begin{aligned} S_n &= x_0 + x_1 + \dots + x_n \\ &= b + bq + \dots + bq^n \\ &= b(1 + q + \dots + q^n) \\ &= b \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}, \text{ dacă } q \neq 1, \end{aligned}$$

în vreme ce dacă $q = 1$, atunci $S_n = (n + 1)b$.

Exercițiu. Determinați termenul general al șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ dat prin

$$1) x_{n+1} = 2x_n - 1, n \geq 0, x_0 = 2; \quad 2) x_{n+1} = \sqrt{3x_n}, n \geq 0, x_0 = 1.$$

Soluție. 1) Relația de recurență este asemănătoare celei care definește o progresie geometrică, diferența fiind dată de prezența termenului liber -1 . Acest termen liber va fi eliminat prin scăderea a două relații de recurență scrise pentru indici succesivi.

Punând $n = 0$ în relația de recurență se obține că $x_1 = 3$. Scriind relația de recurență pentru $n = k + 1$, respectiv $n = k$, și scăzând cele două relații obținute se deduce că $x_{k+2} - x_{k+1} = 2(x_{k+1} - x_k)$. Notând $y_n = x_{n+1} - x_n$, observăm că $y_{k+1} = 2y_k$, deci $(y_k)_{k \geq 0}$ este o progresie geometrică cu rație 2. Deoarece $y_0 = x_1 - x_0 = 1$, se deduce că $y_n = y_0 2^n = 2^n$.

Cum $y_k = x_{k+1} - x_k$, urmează că $x_{k+1} - x_k = 2^k$. Punând succesiv $k = 0, k = 1, \dots, k = n - 1$ și sumând relațiile obținute deducem că

$$x_n - x_0 = 1 + 2 + \dots + 2^n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1,$$

deci $x_n = x_0 + 2^n - 1 = 2^n + 1$.

Similar, putem determina $c \in \mathbb{R}$ astfel ca $(x_n + c)_{n \geq 0}$ să fie progresie geometrică. În acest scop, adunăm mai întâi c în ambii membri ai relației de recurență. Obținem că

$$x_{n+1} + c = 2x_n - 1 + c = 2\left(x_n + \frac{c-1}{2}\right).$$

În concluzie, pentru $c = \frac{c-1}{2}$, adică pentru $c = -1$, urmează că $(x_n + c)_{n \geq 0}$ este progresie geometrică de rație 2. De aici,

$$x_n - 1 = 2^n(x_0 - 1) = 2^n,$$

de unde $x_n = 2^n + 1$.

2) Punând $n = 0$ în relația de recurență se obține că $x_1 = \sqrt{3}$. Prin logaritma-rea relației de recurență se obține că

$$\ln x_{n+1} = \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{1}{2} \ln x_{n+1}.$$

Cu notația $z_n = \ln x_n$, se obține că $z_{n+1} = \frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2} \ln 3$, $z_1 = \ln x_1 = \frac{1}{2} \ln 3$, $z_0 = \ln x_0 = 0$.

Scriind relația de recurență pentru $n = k + 1$, respectiv $n = k$, și scăzând cele două relații obținute se deduce că $z_{k+2} - z_{k+1} = \frac{1}{2}(z_{k+1} - z_k)$. Notând $y_n = z_{n+1} - z_n$, observăm că $y_{k+1} = \frac{1}{2}y_k$, deci $(y_k)_{k \geq 0}$ este o progresie geometrică cu rație $\frac{1}{2}$. Deoarece $y_0 = z_1 - z_0 = \frac{1}{2} \ln 3$, se deduce că $y_n = y_0 \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}} \ln 3$.

Cum $y_k = z_{k+1} - z_k$, urmează că $z_{k+1} - z_k = \frac{1}{2^{k+1}} \ln 3$. Punând succesiv $k = 0, k = 1, \dots, k = n - 1$ și sumând relațiile obținute deducem că

$$\begin{aligned} z_n - z_0 &= \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{1}{2^2} \ln 3 + \dots + \frac{1}{2^n} \ln 3 = \frac{1}{2} \ln 3 \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln 3 \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \ln 3. \end{aligned}$$

deci $z_n = z_0 + \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \ln 3 = \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \ln 3$. Cum $z_n = \ln x_n$, urmează că

$$x_n = e^{z_n} = e^{\left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \ln 3} = e^{\ln 3 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)} = 3^{1 - \frac{1}{2^n}}.$$

2.1.2 Subșiruri ale unui șir dat

Numim *subșir* al șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ ai cărui termeni sunt elemente ale mulțimii termenilor șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, $A = \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$, cu $k_0 < k_1 < k_2 < \dots < k_n \dots$

Cum un subșir $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ nu conține neapărat toți termenii șirului inițial $(x_n)_{n \geq 0}$, urmează că $k_n \geq n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Exemple. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$. Atunci subșirul $(x_{2n})_{n \geq 0}$: $x_0, x_2, x_4, \dots, x_{2n}, \dots$ se numește *subșirul termenilor de rang par ai șirului*. Subșirul $(x_{2n+1})_{n \geq 0}$: $x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2n+1}, \dots$ se numește *subșirul termenilor de rang impar ai șirului*. Un alt subșir este $(x_{n+3})_{n \geq 0}$: x_3, x_4, x_5, \dots , obținut prin eliminarea primilor trei termeni ai șirului.

Cum pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$ putem construi șirul $(x_{kn})_{n \geq 0}$: $x_0, x_k, x_{2k}, \dots, x_{kn}, \dots$

al termenilor de rang divizibil cu k , urmează că orice șir are o infinitate de subșiruri.

2.1.3 Șiruri mărginite

Fie un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ de numere reale și $A = \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\}$ mulțimea termenilor săi. Vom spune că $(x_n)_{n \geq 0}$ se numește *mărginit* dacă A este mărginită, respectiv că $(x_n)_{n \geq 0}$ este *mărginit superior* (respectiv *mărginit inferior*) dacă A este majorată (respectiv minorată). Un șir care nu este mărginit (respectiv nu este mărginit superior sau nu este mărginit inferior) se numește *nemărginit* (respectiv *nemărginit superior* sau *nemărginit inferior*).

Conform caracterizării mulțimilor mărginite, aplicată mulțimii A a termenilor șirului, se obțin următoarele proprietăți.

Teorema 2.1. Fie șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 0}$.

1. $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit superior dacă și numai dacă există $b \in \mathbb{R}$ astfel ca $x_n \leq b$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
2. $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit inferior dacă și numai dacă există $a \in \mathbb{R}$ astfel ca $a \leq x_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
3. $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit dacă și numai dacă există $a, b \in \mathbb{R}$ astfel ca $a \leq x_n \leq b$ pentru orice $n \geq 0$, ceea ce este echivalent cu faptul că există $M > 0$ astfel ca $|x_n| \leq M$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Exemple. 1. $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = \sin \frac{n\pi}{3}$ este mărginit, deoarece $-1 \leq x_n \leq 1$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

2. $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$ este mărginit, deoarece $|x_n| \leq 3$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

3. $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = \frac{n}{3^n}$ este mărginit, deoarece conform inegalității lui Bernoulli, $3^n = (1+2)^n \geq 1+2n$, deci $\frac{n}{3^n} < \frac{1}{2}$. Se obține că $0 \leq x_n \leq \frac{1}{2}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

4. $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = (-1)^n n$ nu este mărginit, nefiind nici mărginit inferior,

nici mărginit superior.

Aplicând operatorul de negație logică afirmațiilor din teorema de mai sus obținem următoarea teoremă de caracterizare a șirurilor nemărginite.

Teorema 2.2. Fie șirul de numere reale $(x_n)_{n \geq 0}$.

1. $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit superior dacă și numai dacă pentru orice $b \in \mathbb{R}$ există un rang $n_b \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_{n_b} > b$.
2. $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit inferior dacă și numai dacă pentru orice $a \in \mathbb{R}$ există un rang $n_a \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_{n_a} < a$.

2.1.4 Șiruri monotone

Fie un șir de numere reale $(x_n)_{n \geq 0}$. Spunem că $(x_n)_{n \geq 0}$ este *crescător* (respectiv *strict crescător*) dacă $x_n \leq x_{n+1}$ pentru orice $n \geq 0$ (respectiv $x_n < x_{n+1}$ pentru orice $n \geq 0$), adică orice termen al șirului este mai mic (respectiv strict mai mic) decât termenul care-i succede.

De asemenea, spunem că $(x_n)_{n \geq 0}$ este *descrescător* (respectiv *strict descrescător*) dacă $x_n \geq x_{n+1}$ pentru orice $n \geq 0$ (respectiv $x_n > x_{n+1}$ pentru orice $n \geq 0$), adică orice termen al șirului este mai mare (respectiv strict mai mare) decât termenul care-i succede.

Un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ crescător sau descrescător se va numi șir *monoton*, iar un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ strict crescător sau strict descrescător se va numi șir *strict monoton*. Desigur, orice șir strict monoton este și monoton; nu și reciproc.

Pentru a preciza monotonia unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ se pot folosi următoarele metode.

Studierea semnului diferenței $x_{n+1} - x_n$.

- Dacă $x_{n+1} - x_n \geq 0$ pentru orice $n \geq 0$, atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este crescător.
- Dacă $x_{n+1} - x_n \leq 0$ pentru orice $n \geq 0$, atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este descrescător.

Compararea raportului $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ cu 1, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir cu termeni strict pozitivi.

- Dacă $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$ pentru orice $n \geq 0$, atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este crescător.
- Dacă $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$ pentru orice $n \geq 0$, atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este descrescător.

Folosind inegalități stricte în locul inegalităților nestrictă se obțin criteriile corespunzătoare de monotonie strictă.

Legătura între monotonia și mărginirea unui șir

Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir crescător, atunci

$$x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq \dots,$$

deci $x_0 \leq x_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, iar $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit inferior de primul termen x_0 .

Similar, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir descrescător, atunci

$$x_0 \geq x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq \dots,$$

deci $x_0 \geq x_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$, iar $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit superior de primul termen x_0 . Au loc atunci următoarele proprietăți.

Teorema 2.3. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir.

1. Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este crescător, atunci el este mărginit inferior.
2. Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este descrescător, atunci el este mărginit superior.

2.2 Șiruri cu limită

Noțiunea de limită a unui șir este unul dintre cele mai importante concepte ale analizei matematice, precizând tendința termenilor unui șir de a se apropia de un anumit număr (cazul șirurilor cu limită finită), sau de a deveni oricât de mari, respectiv oricât de mici (cazul șirurilor cu limită infinită).

Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Spunem că $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita $l \in \overline{\mathbb{R}}$ dacă orice vecinătate $V \in \mathcal{V}(l)$ lasă în afara ei cel mult un număr finit de termeni ai șirului, adică există un rang $n_V \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_n \in V$ pentru orice $n \geq n_V$ (altfel spus, vecinătatea V conține toți termenii șirului de la rangul n_V încolo). În acest caz, vom nota $x_n \rightarrow l$ pentru $n \rightarrow \infty$ sau $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, spunându-se și că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ (sau termenul său general x_n) tinde la l .

Se poate observa că adăugarea sau eliminarea unui număr finit de termeni ai șirului nu-i schimbă acestuia natura de a avea sau nu limită și nici limita, dacă

aceasta există, putându-se modifica doar rangul începând cu care termenii șirului aparțin unei vecinătăți date.

- Exemple.**
1. Un șir constant $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = c$, $c \in \mathbb{R}$, este convergent la c , întrucât orice vecinătate $V \in \mathcal{V}(c)$ conține toți termenii șirului.
 2. Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = n$ are limita $+\infty$. Pentru a demonstra acest lucru, observăm că orice vecinătate $V \in \mathcal{V}(+\infty)$ conține un interval de forma $(M_V, +\infty]$. Fie $n_V = [M_V] + 1$. Atunci $n_V > M$, deci $x_{n_V} \in (M, +\infty] \subseteq V$. Analog, $x_n \in V$ pentru orice $n > n_V$, deci $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita $+\infty$.
 3. În mod asemănător se poate demonstra că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = -n$ are limita $-\infty$.

Unicitatea limitei unui șir

În cele ce urmează, se va observa mai întâi că limita unui șir, dacă există, este unică.

Teorema 2.4. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_1 \in \overline{\mathbb{R}}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l_2 \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci $l_1 = l_2$.

Subșiruri ale unui șir cu limită

Este ușor de observat că proprietățile de monotonie și mărginire se transmit de la un șir către subșirurile sale. Astfel, dacă un șir este monoton, orice subșir al său este de asemenea monoton, cu același sens de monotonie, iar dacă un șir este mărginit, orice subșir al său este de asemenea mărginit, mulțimea termenilor subșirului fiind inclusă în mulțimea (mărginită) a termenilor șirului. Pe aceeași linie de gândire, proprietatea unui șir de a avea limită se transmite de asemenea către subșirurile sale.

Teorema 2.5. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci orice subșir $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ al său are aceeași limită.

Condiție suficientă ca un șir să nu aibă limită

Conform teoremei de mai sus, se observă că dacă un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ are două subșiruri care tind la limite diferite, atunci el nu are limită, deoarece dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ ar avea limita l , atunci și cele două subșiruri ar avea aceeași limită l .

Exemplu. Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$ nu are limită, deoarece subșirul termenilor de rang par $(x_{2n})_{n \geq 0}$: $x_{2n} = 1$ și subșirul termenilor de rang impar $(x_{2n+1})_{n \geq 0}$: $x_{2n+1} = -1$ au limitele diferite $l_1 = 1$, respectiv $l_2 = -1$.

2.2.1 Șiruri convergente

Un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ cu limită finită l se numește *șir convergent*, spunându-se și că $(x_n)_{n \geq 0}$ este *convergent către l* . Orice șir care nu este convergent se numește *divergent*.

În acest sens, șirurile divergente pot fi deci șiruri cu limită infinită sau șiruri fără limită. În plus, orice subșir al unui șir convergent este convergent la aceeași limită ca și șirul inițial, conform Teoremei 2.5. De aici, dacă un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ conține un subșir cu limită infinită, sau două subșiruri cu limite diferite, atunci el este divergent.

Exemplu. Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{1+(-1)^n}{2}n$ este divergent, deoarece subșirul termenilor de rang par $(x_{2n})_{n \geq 0}$: $x_{2n} = 2n$ are limita $+\infty$.

Caracterizarea analitică a limitei unui șir

Definiția cu vecinătăți a limitei unui șir, deși utilă teoretic, este greu de verificat sau folosit în aplicații. Vom prezenta în cele ce urmează câteva caracterizări echivalente cu un pronunțat aspect numeric, utile pentru demonstrarea unor proprietăți verificabile practic. Mai întâi, este abordată situația șirurilor convergente.

Teorema 2.6. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale și $l \in \mathbb{R}$. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent către l dacă și numai dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $|x_n - l| < \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon$.

De fapt, proprietatea din enunțul Teoremei 2.6 este echivalentă cu proprietatea de definiție a șirurilor convergente, putând fi folosită în locul acesteia pentru definirea noțiunii de șir convergent.

Exercițiu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{2n+5}{n+2}$. Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Soluție. Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar. Au loc relațiile

$$|x_n - 2| = \frac{1}{n+2} < \varepsilon$$

cu condiția ca

$$\frac{1}{n+2} < \varepsilon \Leftrightarrow n+2 > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 2.$$

Atunci

$$n_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 2 \right] + 1 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] - 1,$$

iar pentru $n \geq n_\varepsilon$, $|x_n - 2| < \varepsilon$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Exercițiu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir convergent de numere întregi. Arătați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este constant de la un rang încolo.

Soluție. Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R}$. Pentru $\varepsilon = \frac{1}{4}$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel ca $|x_n - l| < \frac{1}{4}$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon$, deci $x_n \in (l - \frac{1}{4}, l + \frac{1}{4})$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon$. Cum intervalul $(l - \frac{1}{4}, l + \frac{1}{4})$ are lungime $\frac{1}{2}$, el nu poate conține decât un singur număr întreg, deci $(x_n)_{n \geq 0}$ este constant începând cu rangul n_ε , termenii săi fiind egali cu numărul întreg respectiv.

Șiruri cu limită infinită (1)

În continuare, este abordată situația șirurilor cu limită infinită, observându-se că șirurile cu limita $+\infty$ au termeni „oricât de mari” de la un rang încolo, respectiv șirurile cu limita $-\infty$ au termeni „oricât de mici” de la un rang încolo.

Teorema 2.7. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Atunci

1. $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita $+\infty$ dacă și numai dacă pentru orice $M > 0$ există un rang $n_M \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_n > M$ pentru orice $n \geq n_M$.
2. $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita $-\infty$ dacă și numai dacă pentru orice $M > 0$ există un rang $n_M \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_n < -M$ pentru orice $n \geq n_M$.

Exercițiu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{n^2 + 2n + 3}{n+1}$. Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Soluție. Fie $M > 0$ arbitrar. Au loc relațiile

$$x_n = n + 1 + \frac{2}{n+1} > M$$

cu condiția ca

$$n + 1 > M \Leftrightarrow n > M - 1.$$

Atunci $n_M = [M - 1] + 1 = [M]$, iar pentru $n \geq n_M$, $x_n > M$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Șiruri cu limita 0

În aceste condiții, studiul șirurilor convergente cărora le este cunoscută limita poate fi redus la studiul unor șiruri convergente la 0, observându-se că un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita $l \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă diferența dintre șir și limita sa tinde la 0; acesta este doar un alt fel de a spune că termenii unui șir convergent devin „apropiați” de limita șirului de la un rang încolo.

Teorema 2.8. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale și $l \in \mathbb{R}$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ dacă și numai dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - l) = 0$.

Demonstrație. Conform teoremei de caracterizare a șirurilor convergente (Teorema 2.6),

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \text{ astfel încât } |x_n - l| < \varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \text{ astfel încât } |(x_n - l) - 0| < \varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - l) = 0. \end{aligned}$$

■

Proprietatea de păstrare a semnului

Se poate observa că termenii unui șir cu limită au, cu excepția eventuală a unui număr finit dintre ei, același semn cu limita șirului.

Teorema 2.9. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale cu limita $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Dacă $l > 0$, atunci toți termenii șirului sunt strict pozitivi de la un rang încolo.
2. Dacă $l < 0$, atunci toți termenii șirului sunt strict negativi de la un rang încolo.
3. Dacă $l \neq 0$, atunci toți termenii șirului sunt nenuli de la un rang încolo.

Șiruri cu limită infinită (2)

Teorema 2.10. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale.

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ (respectiv $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$), atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, iar $x_n > 0$ (respectiv $x_n < 0$) de la un rang încolo, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$ (respectiv $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = -\infty$).

Rezultatele teoremei de mai sus pot fi prezentate sub forma prescurtată

$$\frac{1}{+\infty} = 0, \quad \frac{1}{-\infty} = 0, \quad \frac{1}{0+} = +\infty, \quad \frac{1}{0-} = -\infty.$$

Cu ajutorul Teoremei 2.6, se poate acum obține următorul rezultat frecvent folosit în aplicații.

Teorema 2.11. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir monoton crescător de numere reale care este nemărginit superior. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0.$$

Cu un raționament asemănător, se poate demonstra și următoarea teoremă complementară celei de mai sus.

Teorema 2.12. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir monoton descrescător de numere reale care este nemărginit inferior. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0.$$

Exemple. Pentru $k \in (0, \infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0$. De exemplu, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Pentru $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{q^n} = 0$. De exemplu, $\lim_{n \rightarrow \infty} 5^n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$.

Pentru $q \in (0, 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ (deoarece $p = \frac{1}{q} > 1$, iar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p^n} (= \lim_{n \rightarrow \infty} q^n) = 0$).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + n + 1} = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + n + 1}} = 0.$$

Criterii de majorare-minorare

Conform teoremei anterioare, pentru a arăta că limita unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ este $l \in \mathbb{R}$, poate fi studiată diferența dintre termenii șirului și limita acestuia. Teorema următoare afirmă faptul că dacă această diferență poate fi estimată potrivit, cu valori din ce în ce mai mici (α_n de mai jos poate fi înțeles ca o eroare de aproximare), atunci într-adevăr șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita l .

Teorema 2.13. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale și $l \in \mathbb{R}$. Dacă există un șir $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ de numere reale pozitive și un rang oarecare $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$|x_n - l| \leq \alpha_n \text{ pentru orice } n \geq n_0, \text{ iar } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$.

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar. Cum $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ este convergent la 0, urmează că există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel ca $|\alpha_n - 0| < \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon$. De aici, $|x_n - l| \leq \alpha_n < \varepsilon$ pentru orice $n \geq \max(n_0, n_\varepsilon)$, iar $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$. ■

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{2n+3}{n+1}$. Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Soluție. Are loc relația

$$|x_n - 2| = \frac{1}{n+1}, \text{ iar } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

deoarece $(y_n)_{n \geq 0}$: $y_n = n + 1$ este un șir crescător și nemărginit superior. De aici, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \frac{\sin n}{n}$. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Soluție. Au loc relațiile

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{n}, \text{ iar } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Se va observa acum că dacă termenii unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ pot fi minorați cu termeni „oricât de mari” ai unui șir $(a_n)_{n \geq 0}$ (i.e. $(a_n)_{n \geq 0}$ are limita $+\infty$), atunci ei sunt de asemenea „oricât de mari” (i.e. $(x_n)_{n \geq 0}$ are tot limita $+\infty$). De asemenea, dacă termenii unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ pot fi majorați cu termeni „oricât de mici” ai unui șir $(b_n)_{n \geq 0}$ (i.e. $(b_n)_{n \geq 0}$ are limita $-\infty$), atunci ei sunt de asemenea „oricât de mici” (i.e. $(x_n)_{n \geq 0}$ are tot limita $-\infty$).

Teorema 2.14. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale.

1. Dacă există un șir de numere reale $(a_n)_{n \geq 0}$ cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ și un rang $n_a \in \mathbb{N}$ astfel ca $a_n \leq x_n$ pentru orice $n \geq n_a$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.
2. Dacă există un șir de numere reale $(b_n)_{n \geq 0}$ cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ și un rang $n_b \in \mathbb{N}$ astfel ca $x_n \leq b_n$ pentru orice $n \geq n_b$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Demonstrație. 1. Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ și fie $M > 0$ arbitrar. Există atunci un rang n_M astfel ca $a_n > M$ pentru orice $n \geq n_M$. De aici, $x_n \geq a_n > M$ pentru orice $n \geq \max(n_a, n_M)$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. Demonstrația celei de-a doua proprietăți este asemănătoare. ■

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = n + (-1)^n$. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Soluție. Are loc inegalitatea $x_n \geq n - 1$ pentru orice $n \geq 0$, iar $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - 1) = \infty$, de unde concluzia.

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Soluție. Mai întâi, să observăm că

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \text{ pentru orice } k \geq 1,$$

deci, prin sumare după k de la 1 la n ,

$$x_n > 2(\sqrt{n+1} - 1) \text{ pentru orice } n \geq 1,$$

iar cum $\lim_{n \rightarrow \infty} 2(\sqrt{n+1} - 1) = \infty$, urmează concluzia.

Șiruri conținând funcția modul

Prezentăm în continuare câteva consecințe ale Teoremei 2.13, exprimând faptul că funcția modul păstrează convergența șirurilor.

Teorema 2.15. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Atunci

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, iar $l \in \mathbb{R}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |l|$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$.
3. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Se va observa că reciproca primei afirmații nu este adevărată. În acest sens, fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$. Atunci $|x_n| \rightarrow 1$ pentru $n \rightarrow \infty$, dar $(x_n)_{n \geq 0}$ nu are limită. În plus, afirmațiile 2. și 3. pot fi cumulate sub forma

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0.$$

De asemenea, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = +\infty$, cu un raționament asemănător celui de mai sus.

Limita șirului $(q^n)_{n \geq 0}$

Din cele de mai sus, se obține că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \text{ pentru } q \in (-1, 1).$$

Acest lucru a fost observat deja pentru $q \in (0, 1)$, conform Teoremei 2.11. Pentru $q \in (-1, 0)$, $|q^n| = |q|^n$, iar $|q| \in (0, 1)$, deci $\lim_{n \rightarrow \infty} |q^n| = 0$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, conform celei de-a treia proprietăți de mai sus. În fine, proprietatea este evidentă pentru $q = 0$.

Fie acum $q \in (-\infty, -1)$. Cum $q^{2n} \rightarrow \infty$ iar $q^{2n+1} \rightarrow -\infty$, urmează că nu există $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$. Se observă în mod analog ca nu există $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$ nici pentru $q = -1$.

Discuția de mai sus poate fi sistematizată sub următoarea formă prescurtată

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} \text{nu există,} & \text{dacă } q \leq -1 \\ 0, & \text{dacă } q \in (-1, 1) \\ 1, & \text{dacă } q = 1 \\ +\infty, & \text{dacă } q > 1 \end{cases}.$$

2.2.2 Proprietăți ale șirurilor cu limită

Teorema ce urmează, numită și *teorema de trecere la limită în inegalități* exprimă faptul că inegalitățile (nestrict) dintre termenii a două șiruri se păstrează prin trecere la limită.

Teorema 2.16. Fie două șiruri $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ cu proprietățile

1. Există un rang n_0 astfel ca $x_n \leq y_n$ pentru $n \geq n_0$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci $x \leq y$.

Inegalitățile nestrict dintre termenii a două șiruri nu se păstrează neapărat prin trecere la limită. Aceasta se poate observa considerând șirurile $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{1}{n+2}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$: $y_n = \frac{1}{n+1}$, pentru care $x_n < y_n$ pentru orice $n \geq 0$, dar $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

Teorema de mai jos, numită și *teorema cleștelui*, ne permite să calculăm limita unui șir care poate fi încadrat între alte două șiruri având aceeași limită.

Teorema 2.17. Fie trei șiruri de numere reale $(a_n)_{n \geq 0}$, $(x_n)_{n \geq 0}$, $(b_n)_{n \geq 0}$ cu proprietățile

1. Există un rang n_0 astfel ca $a_n \leq x_n \leq b_n$ pentru $n \geq n_0$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci există $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, iar $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$.

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{n^2+n}$. Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Soluție. Observăm că dintre cei n termeni conținuți în suma care definește x_n , $\frac{1}{n^2+n}$ este cel mai mic, iar $\frac{1}{n^2+1}$ este cel mai mare. Urmează că $n \cdot \frac{1}{n^2+n} \leq x_n \leq n \cdot \frac{1}{n^2+1}$, deci

$$\frac{1}{n+1} \leq x_n \leq \frac{n}{n^2+1} < \frac{1}{n},$$

iar deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, urmează că de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $(x_n)_{n \geq 1}$ fiind încadrat între șirurile $(\frac{1}{n+1})_{n \geq 1}$, $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ cu limita 0.

2.2.3 Relații între convergență, monotonie și mărginire

În cele ce urmează, vom studia relațiile dintre proprietățile de monotonie, mărginire și convergență.

Teorema 2.18. *Orice șir convergent este mărginit.*

Demonstrație. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R}$. Punând $\varepsilon = 1$ în Teorema 2.6, obținem că există $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel încât $|x_n - l| < 1$ pentru orice $n \geq n_1$, sau $l - 1 < x_n < l + 1$ pentru orice $n \geq n_1$. Pentru a obține inegalități valabile și pentru $x_0, x_1, \dots, x_{n_1-1}$, observăm că, pentru orice $n \geq 0$,

$$\min(x_0, x_1, \dots, x_{n_1-1}, l - 1) \leq x_n \leq \max(x_0, x_1, \dots, x_{n_1-1}, l + 1)$$

deci $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit. ■

Teorema 2.19. *Orice șir nemărginit este divergent.*

Demonstrație. Se aplică operatorul de negație logică propoziției de mai sus. ■

Exemple. 1. *Nu orice șir mărginit este convergent.*

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$ nu este convergent, deoarece subșirul termenilor de rang par $(x_{2n})_{n \geq 0}$: $x_{2n} = 1$ și subșirul termenilor de rang impar $(x_{2n+1})_{n \geq 0}$: $x_{2n+1} = -1$ au limitele diferite $l_1 = 1$, respectiv $l_2 = -1$. În schimb, $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit, deoarece $-1 \leq x_n \leq 1$ pentru orice $n \geq 0$.

2. *Nu orice șir convergent este monoton.*

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ este convergent la 0, deoarece $|x_n| = \frac{1}{n}$, iar $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, dar nu este monoton, luând alternativ atât valori pozitive, cât și negative.

3. *Nu orice șir monoton este mărginit.*

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = 2n + 1$ este monoton, dar nu este mărginit, fiind nemărginit superior.

4. Nu orice șir mărginit este monoton.

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$ este mărginit, dar nu este monoton, luând alternativ atât valori pozitive, cât și negative.

Teorema 2.20. Orice șir monoton și mărginit este convergent.

Din cele de mai sus, se observă de asemenea că toți termenii unui șir monoton crescător și mărginit superior $(x_n)_{n \geq 0}$ sunt mai mici sau egali cu valoarea l a limitei șirului. Similar, toți termenii unui șir monoton descrescător și mărginit inferior $(x_n)_{n \geq 0}$ sunt mai mari sau egali cu valoarea limitei șirului.

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$. Arătați că $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Soluție. Vom arăta că $(x_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit. În acest scop, să observăm că, deoarece $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$, șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător, deci și mărginit inferior. De asemenea, $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ pentru orice $n \geq 2$, deci

$$x_n < \frac{1}{1^2} + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{1^2} + \frac{1}{1} = 2,$$

iar $(x_n)_{n \geq 1}$ este și mărginit superior. Fiind monoton și mărginit, $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Combinând Teorema 2.11, Teorema 2.12 și Teorema 2.20, obținem următorul rezultat, care precizează existența limitei unui șir monoton.

Teorema 2.21. Orice șir monoton $(x_n)_{n \geq 0}$ are limită, finită sau nu.

2.2.4 Operații cu șiruri convergente

În cele ce urmează, se va observa că proprietatea unor șiruri de a fi convergente se păstrează după efectuarea operațiilor uzuale de sumă, diferență, produs cu o constantă, produs termen cu termen, iar în anumite condiții se păstrează și după efectuarea inverselor sau a raportului termen cu termen.

Teorema 2.22. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri convergente de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. Atunci șirul sumă $(x_n + y_n)_{n \geq 0}$, șirul produs cu o constantă $(cx_n)_{n \geq 0}$, $c \in \mathbb{R}$, și șirul produs $(x_n y_n)_{n \geq 0}$ sunt convergente, iar dacă $x \neq 0$ și $x_n \neq 0$ pentru orice $n \geq 0$, atunci și șirul inverselor $(\frac{1}{x_n})_{n \geq 0}$ este convergent. În plus, au loc relațiile

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x + y$
(limita sumei este egală cu suma limitelor).
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = c \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = cx$
(operația de înmulțire cu o constantă comută cu operația de calculare a limitei).
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = xy$
(limita produsului este egală cu produsul limitelor).
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \frac{1}{x}$, dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$
(limita inverselor este egală cu inversa limitei).

Exercițiu. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ definit prin $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n - 1$, $n \geq 0$, $x_0 = 1$. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent.

Soluție. Mai întâi, se observă că $x_1 = -\frac{1}{2} < x_0$. În plus,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}x_n - 1 - \frac{1}{2}x_{n-1} + 1 = \frac{1}{2}(x_n - x_{n-1}),$$

deci

$$\operatorname{sgn}(x_{n+1} - x_n) = \operatorname{sgn}(x_n - x_{n-1}) = \dots = \operatorname{sgn}(x_1 - x_0).$$

Cum $x_1 < x_0$, urmează că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător, deci și mărginit superior de $x_0 = 1$.

Deoarece $x_{n+1} < x_n$, urmează că $x_n > \frac{1}{2}x_n - 1$, deci $x_n > -2$, iar $(x_n)_{n \geq 0}$ este și mărginit inferior. Cum $(x_n)_{n \geq 0}$ este monoton și mărginit, el este convergent. Fie l limita sa; atunci șirul $(\frac{1}{2}x_n)_{n \geq 0}$ are limita $\frac{1}{2}l$, iar șirul $(x_{n+1})_{n \geq 0}$ are tot limita l . Trecând la limită în relația de recurență, obținem că $l = \frac{1}{2}l - 1$, deci $l = -2$.

Proprietățile de mai sus se pot extinde în mod asemănător la operații cu un număr mai mare (dar constant) de șiruri. De exemplu, dacă $(x_n^1)_{n \geq 0}$, $(x_n^2)_{n \geq 0}, \dots$,

$(x_n^k)_{n \geq 0}$ sunt șiruri convergente, cu limitele respectiv l_1, l_2, \dots, l_k , atunci șirul sumă $(x_n^1 + x_n^2 + \dots + x_n^k)_{n \geq 0}$ este convergent, iar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^1 + x_n^2 + \dots + x_n^k) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k.$$

Cazul operațiilor cu un număr variabil de șiruri trebuie tratat cu atenție, așa cum se observă din următorul exemplu

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \right) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

diferența provenind din faptul că paranteza $\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \right)$ conține un număr de n șiruri, n fiind variabil.

Teorema 2.23. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri convergente de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. Atunci șirul diferență $(x_n - y_n)_{n \geq 0}$ este convergent, iar dacă $y \neq 0$ și $y_n \neq 0$ pentru orice $n \geq 0$, atunci și șirul raport $\left(\frac{x_n}{y_n} \right)_{n \geq 0}$ este convergent. În plus, au loc relațiile

$$1. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x - y$$

(limita diferenței este egală cu diferența limitelor).

$$2. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} = \frac{x}{y}, \text{ dacă } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$$

(limita raportului este egală cu raportul limitelor).

Demonstrație. 1. Deoarece $x_n - y_n = x_n + (-1)y_n$, iar $((-1)y_n)_{n \geq 0}$ este convergent cu limita $-y$ (din Teorema 2.22), urmează că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} ((-1)y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

2. Ca mai sus, șirul $\left(\frac{x_n}{y_n} \right)$ este bine definit, cu excepția eventuală a unui număr finit de termeni. Deoarece $\left(\frac{1}{y_n} \right)_{n \geq 0}$ este convergent cu limita $\frac{1}{y}$, urmează că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

■

Se poate demonstra de asemenea următorul rezultat.

Teorema 2.24. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri convergente de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x > 0$, $x_n > 0$ pentru orice $n \geq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. Atunci șirul putere $(x_n^{y_n})_{n \geq 0}$ este convergent. În plus, are loc relația

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{y_n}) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} \text{ (limita puterii se distribuie atât bazei și exponentului).}$$

Alegând șirurile constante $(y_n)_{n \geq 0}: y_n = k, k \in \mathbb{N}^*$, respectiv $(y_n)_{n \geq 0}: y_n = \frac{1}{p}, p \in \mathbb{N}^*, p \geq 2$, se obține următoarea consecință a teoremei de mai sus.

Corolar 2.24.1. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir convergent de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x > 0$, $x_n > 0$ pentru orice $n \geq 0$, $k \in \mathbb{N}^*, p \in \mathbb{N}^*, p \geq 2$. Atunci

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)^k = x^k$ (limita puterii este egală cu puterea limitei).
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{x_n} = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \sqrt[p]{x}$ (limita radicalului este egală cu radicalul limitei).

Analizăm acum cazul în care $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita 0.

Teorema 2.25. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir convergent de numere reale strict pozitive astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ și fie $(y_n)_{n \geq 0}$ un șir convergent de numere reale astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \neq 0$. Atunci

1. Dacă $y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{y_n}) = 0$.
2. Dacă $y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^{y_n}) = +\infty$.

Considerații asemănătoare se pot formula în cazul în care $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir convergent de numere reale strict negative cu limita 0, sau măcar conține termeni negativi, cu rezerva ca $(x_n^{y_n})_{n \geq 0}$ trebuie mai întâi să fie bine definit. De exemplu, pentru $x_n = -\frac{1}{n}$ și $y_n = \frac{1}{2n}$, $x_n^{y_n} = \sqrt[2n]{-\frac{1}{n}}$ nu este definit pentru nicio valoare a lui n .

Totuși, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ au ambele limita 0, nu se poate afirma nimic despre convergența sau divergența șirului $(x_n^{y_n})_{n \geq 0}$, spunându-se că 0^0 este un caz de nedeterminare. Acest lucru se poate observa din următoarele exemple.

- Dacă $x_n = \frac{1}{2^n}, y_n = \frac{1}{n}, n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

- Dacă $x_n = \frac{1}{2^{n^2}}$, $y_n = -\frac{1}{n}$, $n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = 2^n \rightarrow +\infty$.
- Dacă $x_n = \frac{1}{2^n}$, $y_n = -\frac{(-1)^n}{n}$, $n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = 2^{(-1)^n}$ nici măcar nu are limită.

2.2.5 Operații cu șiruri cu limită infinită

Teorema 2.26. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale.

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{-\infty\}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = +\infty$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{+\infty\}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = -\infty$.

Rezultatul Teoremei 2.26 poate fi prezentat și sub forma prescurtată

$$\begin{aligned} \infty + \mathbf{c} &= \infty, & \infty + \infty &= \infty, \\ -\infty + \mathbf{c} &= -\infty, & -\infty + (-\infty) &= -\infty, \mathbf{c} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Teorema 2.27. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale.

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}$, $y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = +\infty$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}$, $y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = -\infty$.
3. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}$, $y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = -\infty$.
4. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}$, $y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = +\infty$.

Rezultatul Teoremei 2.27 poate fi prezentat și sub forma prescurtată

$$\begin{aligned} \mathbf{c.p.} \cdot +\infty &= +\infty, & \mathbf{c.n.} \cdot +\infty &= -\infty, \\ \mathbf{c.p.} \cdot -\infty &= -\infty, & \mathbf{c.n.} \cdot -\infty &= +\infty, \end{aligned}$$

unde prin **c.p.** și **c.n.** înțelegem „constantă reală strict pozitivă” și respectiv „constantă reală strict negativă”.

Teorema 2.28. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale.

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}, y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}, y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = -\infty$.
3. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}, y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = -\infty$.
4. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}, y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

Rezultatul Teoremei 2.28 poate fi prezentat și sub forma prescurtată

$$\begin{aligned} \frac{\infty}{\text{c.p.}} &= \infty, & \frac{\infty}{\text{c.n.}} &= -\infty, \\ \frac{-\infty}{\text{c.p.}} &= -\infty, & \frac{-\infty}{\text{c.n.}} &= \infty. \end{aligned}$$

Teorema 2.29. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale.

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \{-\infty, +\infty\}$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

Rezultatul Teoremei 2.29 poate fi prezentat și sub forma prescurtată

$$\frac{\text{c}}{\infty} = 0, \quad \frac{\text{c}}{\infty} = 0, \text{ c} \in \mathbb{R}.$$

Teorema 2.30. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale.

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}, y > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = +\infty$.
2. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \overline{\mathbb{R}}, y < 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = 0$.

Rezultatul Teoremei 2.30 poate fi prezentat și sub forma prescurtată

$$\infty^{\text{c.p.}} = \infty, \quad \infty^{\text{c.n.}} = 0.$$

Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita ∞ iar $(y_n)_{n \geq 0}$ are limita 0, nu se poate afirma nimic despre convergența sau divergența șirului $(x_n^{y_n})_{n \geq 0}$, spunându-se că ∞^0 este un caz de nedeterminare. Acest lucru se poate observa din următoarele exemple.

- Dacă $x_n = 2^n$, $y_n = \frac{1}{n}$, $n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = 2 \rightarrow 2$.
- Dacă $x_n = 2^{n^2}$, $y_n = \frac{1}{n}$, $n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = 2^n \rightarrow +\infty$.
- Dacă $x_n = 2^n$, $y_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $n \geq 1$, atunci $x_n^{y_n} = 2^{(-1)^n}$ nici măcar nu are limită.

În general, nu se poate afirma nimic despre convergența sau divergența produsului dintre un șir convergent și un alt șir care nu are neapărat limită. Totuși, sub ipoteze adiționale, are loc următorul rezultat.

Teorema 2.31. *Produsul dintre un șir mărginit $(x_n)_{n \geq 0}$ și un șir $(y_n)_{n \geq 0}$ convergent la 0 este un șir convergent la 0.*

Demonstrație. Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar. Cum $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit, există $M > 0$ astfel că $|x_n| \leq M$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Deoarece $(y_n)_{n \geq 0}$ este un șir convergent la 0, există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel ca

$$|y_n - 0| < \frac{\varepsilon}{M} \text{ pentru orice } n \geq n_\varepsilon.$$

Atunci

$$|x_n y_n - 0| = |x_n| |y_n| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon \text{ pentru orice } n \geq n_\varepsilon.$$

Cum ε era arbitrar, urmează că $(x_n y_n)_{n \geq 0}$ este convergent la 0. ■

Exemplu. Dacă $(y_n)_{n \geq 0}$ este convergent la 0, atunci $((-1)^n y_n)_{n \geq 0}$ este de asemenea convergent la 0.

Demonstrație. Este suficient să alegem $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$, care este mărginit. ■

2.2.6 Calculul unor limite fundamentale

Limitele funcțiilor polinomiale

Fie P o funcție polinomială de grad $k \geq 1$,

$$P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_k \neq 0.$$

Considerăm șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = P(n)$. Pentru calculul limitei șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ se va scoate factor comun forțat n^k ($k = \text{grad } P$). Se obține că

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^k \left(a_k + a_{k-1} \frac{1}{n} + \dots + a_1 \frac{1}{n^{k-1}} + a_0 \frac{1}{n^k} \right) \\ &= \infty \cdot a_k = \begin{cases} +\infty, & \text{dacă } a_k > 0 \\ -\infty, & \text{dacă } a_k < 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Să observăm că limita termenului de grad maxim al lui P este de asemenea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k n^k = \infty \cdot a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

de unde se poate remarca faptul că *limita lui $P(n)$ este egală cu limita termenului de grad maxim al lui P .*

- Exemple.**
1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 2n^2 + n - 1) = +\infty$, deoarece coeficientul termenului de grad maxim n^3 este pozitiv.
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^4 + 3n^3 - \sqrt{2}n + 5) = -\infty$, deoarece coeficientul termenului de grad maxim n^4 este negativ.

Limitele funcțiilor raționale

Fie P, Q două funcții polinomiale de grad k , respectiv l , unde $k, l \geq 1$,

$$P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_k \neq 0,$$

$$Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, Q(x) = b_l x^l + b_{l-1} x^{l-1} + \dots + b_1 x + b_0, \quad b_l \neq 0.$$

Considerăm șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, $x_n = \frac{P(n)}{Q(n)}$, presupunând că $Q(n) \neq 0$ pentru orice $n \geq 0$. Pentru calculul limitei șirului $(x_n)_{n \geq 0}$ se va scoate factor comun forțat n^k de la numărător ($k = \text{grad } P$), respectiv n^l de la numitor ($l = \text{grad } Q$). Se obține că

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0}{b_l n^l + b_{l-1} n^{l-1} + \dots + b_1 n + b_0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k \left(a_k + a_{k-1} \frac{1}{n} + \dots + a_1 \frac{1}{n^{k-1}} + a_0 \frac{1}{n^k} \right)}{n^l \left(b_l + b_{l-1} \frac{1}{n} + \dots + b_1 \frac{1}{n^{l-1}} + b_0 \frac{1}{n^l} \right)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-l} \frac{a_k}{b^l} = \begin{cases} 0, & \text{dacă } k < l \\ \frac{a_k}{b^l}, & \text{dacă } k = l. \\ +\infty \frac{a_k}{b^l}, & \text{dacă } k > l \end{cases}$$

Să observăm că limita raportului termenilor de grad maxim este de asemenea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k n^k}{b_l n^l} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-l} \frac{a_k}{b^l},$$

de unde se poate remarca faptul că limita lui $\frac{P(n)}{Q(n)}$ este egală cu limita raportului termenilor de grad maxim ai lui P și Q .

De asemenea, dacă $\text{grad } P < \text{grad } Q$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = 0$, deci dacă gradul numitorului este mai mare decât gradul numărătorului, atunci limita lui $\frac{P(n)}{Q(n)}$ este 0.

Dacă $\text{grad } P = \text{grad } Q$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{a_k}{b_l}$, deci dacă gradul numitorului este egal cu gradul numărătorului, atunci limita lui $\frac{P(n)}{Q(n)}$ este raportul coeficienților termenilor dominanți.

Dacă $\text{grad } P > \text{grad } Q$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = +\infty \frac{a_k}{b_l}$, deci dacă gradul numărătorului este mai mare decât gradul numitorului, atunci limita lui $\frac{P(n)}{Q(n)}$ este $+\infty$ dacă coeficienții termenilor dominanți au același semn, respectiv $-\infty$ dacă coeficienții termenilor dominanți au semne opuse.

Exemple. 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 5}{3n^2 + 6n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(2 - 3\frac{1}{n} + 5\frac{1}{n^2})}{n^2(3 + 6\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})} = \frac{2}{3}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n^2 - n + 2}{2n^2 - 3n + 7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(1 + 4\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + 2\frac{1}{n^3})}{n^2(2 - 3\frac{1}{n} + 7\frac{1}{n^2})} = +\infty \cdot \frac{1}{2} = +\infty.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 3n - 6}{n^3 + 4n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(5 + 3\frac{1}{n} - \frac{6}{n^2})}{n^3(1 + 4\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3})} = 0 \cdot 5 = 0.$$

Subșiruri ale șirurilor mărginite și nemărginite

A fost deja observat că nu orice șir monoton este convergent. Totuși, cu ajutorul teoremei de convergență a șirurilor monotone, putem arăta că din orice șir

mărginit se poate extrage un subșir convergent, acest lucru reprezentând obiectul următorului rezultat, numit și *Lema lui Césaro*.

Teorema 2.32. *Orice șir mărginit $(x_n)_{n \geq 0}$ conține un subșir convergent.*

În mod asemănător, putem observa că șirurile nemărginite conțin subșiruri cu limită infinită.

Teorema 2.33. *Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir.*

1. *Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit superior, atunci el conține un subșir cu limita $+\infty$.*
2. *Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit inferior, atunci el conține un subșir cu limita $-\infty$.*

2.2.7 Puncte limită ale unui șir

Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir dat. Vom numi *mulțimea punctelor limită* ale șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, notată $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$, mulțimea tuturor limitelor de subșiruri ale lui $(x_n)_{n \geq 0}$.

Mai întâi se observă că mulțimea punctelor limită ale unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ dat este totdeauna nevidă. Mai precis, dacă șirul este mărginit, atunci el conține un subșir convergent (Teorema 2.32), cu o limită oarecare l , iar în această situație $l \in \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$. Dacă șirul este nemărginit superior (respectiv superior), atunci $+\infty \in \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ (respectiv $-\infty \in \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$), conform Teoremei 2.33.

Exemplu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n$. Atunci $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \{-1, 1\}$. În acest scop, se observă că orice subșir cu limită (care este în mod necesar finită, deoarece $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit) $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ al lui $(x_n)_{n \geq 0}$ este constant de la un rang încolo, fiind un șir convergent de numere întregi. Fiind constant de la un rang încolo, termenii săi sunt toți egali cu 1 sau -1 începând cu acel rang, iar $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ poate avea fie limita 1, fie limita -1 .

Conform definiției, se pot observa următoarele proprietăți.

1. Dacă o infinitate de termeni ai unui șir $(x_n)_{n \geq 0}$ sunt egali cu un același număr real x , atunci putem construi un subșir convergent la x cu termenii în cauză, deci $x \in \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. Dacă un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ are limita l , finită sau nu, atunci $l \in \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, pe post de subșir convergent la l putând lua chiar șirul $(x_n)_{n \geq 0}$.
3. Există șiruri care au o infinitate de puncte limită. De exemplu, pentru

$$(x_n)_{n \geq 0} : 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, \dots, 1, 2, 3, \dots, n, \dots,$$

orice număr natural este punct limită, întrucât $(x_n)_{n \geq 0}$ conține toate numerele naturale, repetate de o infinitate de ori.

4. Dacă $l \in \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, atunci orice vecinătate V a lui l conține o infinitate de termeni ai șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, deoarece există un subșir $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ al lui $(x_n)_{n \geq 0}$ care este convergent la l și deci V conține toți termenii subșirului $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ de la un rang încolo.

Teorema 2.34. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ are limită dacă și numai dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ se reduce la un singur element.

Limita superioară și limita inferioară a unui șir

Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale și fie șirurile $(a_n)_{n \geq 0}$ și $(b_n)_{n \geq 0}$ definite prin

$$a_n = \inf_{k \geq n} x_k = \inf \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$$

$$b_n = \sup_{k \geq n} x_k = \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\}.$$

Cum $\{x_{n+1}, \dots\} \subseteq \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$, urmează că $a_n \leq a_{n+1}$ și $b_n \geq b_{n+1}$ pentru orice $n \geq 0$, deci $(a_n)_{n \geq 0}$ este monoton crescător, iar $(b_n)_{n \geq 0}$ este monoton descrescător. Cum $(a_n)_{n \geq 0}$ și $(b_n)_{n \geq 0}$ sunt monotone, ele admit limite. De asemenea, se observă că $a_n \leq b_n$ pentru orice $n \geq 0$.

Vom numi atunci *limită superioară* a șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, notată $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ sau $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, limita șirului $(b_n)_{n \geq 0}$. Similar, vom numi *limită inferioară* a șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, notată $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ sau $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, limita șirului $(a_n)_{n \geq 0}$. Deoarece $a_n \leq b_n$ pentru orice $n \geq 0$, urmează că

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Exemplu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = 2 \sin \frac{n\pi}{3} + (-1)^n$. Pentru $n = 6k, k \geq 0$, urmează că $x_{6k} = \sin(2k\pi) + 1 = 1$. Similar, $x_{6k+1} = \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$, $x_{6k+2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$, $x_{6k+3} = -1$, $x_{6k+4} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$, $x_{6k+5} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - 1$. Cum fiecare dintre aceste subșiruri este convergent, fiind constant, urmează că

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{\sqrt{3}}{2} - 1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{3}}{2} + 1.$$

Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit superior, există $M \in \mathbb{R}$ astfel ca $x_n \leq M$ pentru orice $n \geq 0$. Urmează că de asemenea $b_n \leq M$ pentru orice $n \geq 0$, deci $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n (= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n)$ este finită. Similar, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit inferior, atunci $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ este finită. De asemenea, conform Teoremei 2.33, dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit superior, atunci $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, iar dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este nemărginit inferior, atunci $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Fie acum $l \in \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} x_n$. Există atunci un subșir $(x_{k_n})_{n \geq 0}$ astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{k_n} = l$. Cum

$$\inf_{l \geq k_n} x_l \leq x_{k_n} \leq \sup_{l \geq k_n} x_l \text{ pentru orice } k_n \geq 0,$$

urmează că

$$a_{k_n} \leq x_{k_n} \leq b_{k_n} \text{ pentru orice } k_n \geq 0,$$

iar trecând la limită în aceste inegalități obținem că

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq l \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Mai mult, se poate demonstra că $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \in \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} x_n$ și $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ este cel mai mare punct limită al șirului $(x_n)_{n \geq 0}$. Similar, $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \in \text{LIM}_{n \rightarrow \infty} x_n$ și $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ este cel mai mic punct limită al șirului $(x_n)_{n \geq 0}$. În plus, deoarece

$$a_n = \inf_{k \geq n} x_k \geq \inf_{k \geq 0} x_k, \quad b_n = \sup_{k \geq n} x_k \leq \sup_{k \geq 0} x_k,$$

urmează că

$$\inf_{k \geq 0} x_k \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup_{k \geq 0} x_k,$$

deci $\text{LIM}_{n \rightarrow \infty} x_n$ este cuprinsă între marginea inferioară și marginea superioară a termenilor șirului. Teorema 2.34 se poate reformula atunci sub forma următoare.

Teorema 2.35. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ are limită dacă și numai dacă $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$. În această situație,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Exemplul următor indică faptul că, dat fiind un șir $(x_n)_{n \geq 0}$, nu trebuie confundată $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ cu $\sup_{n \geq 0} x_n$ și nici $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ cu $\inf_{n \geq 0} x_n$. Acest lucru este de altfel evident din faptul că $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ și $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$, fiind puncte limită, nu sunt influențate de valorile primilor termeni ai șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, pe când $\sup_{n \geq 0} x_n$ și $\inf_{n \geq 0} x_n$ sunt.

Exemplu. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = (-1)^n \frac{n+2}{n+1}$. Atunci $x_{2n} = \frac{2n+2}{2n+1}$, care este strict descrescător cu limita 1, iar $x_{2n+1} = -\frac{2n+4}{2n+3}$, care este strict crescător, cu limita -1 . Atunci

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -1, \quad \sup_{n \geq 0} x_n = x_0 = 2, \quad \inf_{n \geq 0} x_n = x_1 = -\frac{3}{2}.$$

Totuși, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ și $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ rețin unele proprietăți de mărginire caracteristice $\sup_{n \geq 0} x_n$ și $\inf_{n \geq 0} x_n$, chiar dacă într-o formă mai slabă. Aceste proprietăți sunt cuprinse în următorul rezultat. Reamintim că

$$x_n \leq \sup_{n \geq 0} x_n \text{ pentru orice } n \geq 0, \quad x_n \geq \inf_{n \geq 0} x_n \text{ pentru orice } n \geq 0.$$

Teorema 2.36. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir mărginit și fie $\varepsilon > 0$. Atunci

1. Există $n_\varepsilon^1 \in \mathbb{N}$ astfel că $x_n < \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon^1$.
2. Există $n_\varepsilon^2 \in \mathbb{N}$ astfel că $x_n > \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n - \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon^2$.

Cu un raționament asemănător, folosind teoremele de caracterizare analitică a marginii superioare și marginii inferioare a unei mulțimi, se poate demonstra că marginea superioară și marginea inferioară a unei mulțimi mărginite se pot obține ca limite de șiruri cu elemente din acea mulțime.

Teorema 2.37. Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ o mulțime mărginită. Există atunci două șiruri $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ de elemente din A astfel ca $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \inf A$.

2.2.8 Șiruri fundamentale (Cauchy)

În cazurile în care limita unui șir este dificil de intuit sau determinat numeric, poate fi util un criteriu de convergență care să nu facă apel la determinarea limitei șirului. Considerațiile de mai jos permit demonstrarea convergenței unui șir fără determinarea limitei acestuia.

Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir. Spunem că $(x_n)_{n \geq 0}$ este *șir fundamental*, sau *șir Cauchy*, dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $|x_n - x_m| \leq \varepsilon$ pentru orice $m, n \geq n_\varepsilon$.

Echivalent, $(x_n)_{n \geq 0}$ este *șir Cauchy* dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $|x_n - x_{n+p}| \leq \varepsilon$ pentru orice $n \geq n_\varepsilon$ și orice $p \geq 0$. Intuitiv, într-un șir Cauchy toți termenii sunt apropiați unul de celălalt de la un rang încolo.

Teorema 2.38. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir Cauchy. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit.

În particular, fiind mărginit, orice șir Cauchy $(x_n)_{n \geq 0}$ admite un subșir convergent.

Teorema 2.39. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este șir Cauchy dacă și numai dacă este convergent.

Exercițiu. Fie $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 1}$ nu este convergent.

Soluție. Vom arăta că $(x_n)_{n \geq 1}$ nu este șir Cauchy. Să presupunem prin reducere la absurd că $(x_n)_{n \geq 1}$ este șir Cauchy. Conform definiției șirului Cauchy, aplicată pentru $\varepsilon = \frac{1}{3}$, există un rang $n_1 \in \mathbb{N}$ astfel ca $|x_n - x_m| \leq \frac{1}{3}$ pentru orice $m, n \geq n_1$. În particular, pentru $m = 2n$, urmează că

$$|x_n - x_{2n}| \leq \frac{1}{3} \text{ pentru orice } n \geq n_1.$$

De asemenea,

$$|x_n - x_{2n}| = \left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right| \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

contradicție. Urmează că $(x_n)_{n \geq 1}$ nu este șir Cauchy, deci nu este nici convergent.

Exercițiu. Fie $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \frac{\cos x}{2} + \frac{\cos 2x}{2^2} + \dots + \frac{\cos nx}{2^n}$. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 1}$ este convergent.

Soluție. Vom arăta că $(x_n)_{n \geq 1}$ este șir Cauchy. Mai întâi, observăm că au loc inegalitățile

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &= \left| \frac{\cos(n+1)x}{2^{n+1}} + \frac{\cos(n+2)x}{2^{n+2}} + \dots + \frac{\cos(n+p)x}{2^{n+p}} \right| \\ &\leq \left| \frac{\cos(n+1)x}{2^{n+1}} \right| + \left| \frac{\cos(n+2)x}{2^{n+2}} \right| + \dots + \left| \frac{\cos(n+p)x}{2^{n+p}} \right| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \dots + \frac{1}{2^{n+p}} = \frac{1}{2^{n+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{p-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \frac{1 - \frac{1}{2^p}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{1}{2^{n+1}} \cdot 2 = \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

Fie $\varepsilon > 0$. Deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$, există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel ca $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ pentru $n \geq n_\varepsilon$. De aici,

$$|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \text{ pentru orice } n \geq n_\varepsilon \text{ și orice } p \geq 0.$$

Urmează că $(x_n)_{n \geq 1}$ este șir Cauchy, deci este convergent.

2.2.9 Criterii de convergență utilizând raportul $\frac{x_{n+1}}{x_n}$

Prezentăm mai întâi o inegalitate între limitele unor șiruri de radicali, respectiv rapoarte, asociate unui șir cu termeni strict pozitivi.

Teorema 2.40. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir cu termeni strict pozitivi. Are loc inegalitatea

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

Conform Teoremei 2.35, din rezultatul de mai sus se poate deduce imediat următorul criteriu de existență a limitei radicalului de ordin n al unui șir dat. În acest mod se poate reduce calculul unor limite care conțin radicali de ordin n la calculul unor limite de rapoarte, care pot fi mai simple decât cele dintâi.

Teorema 2.41. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir cu termeni strict pozitivi. Dacă există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$.

Exercițiu. Demonstrați că

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$, unde $a > 0$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Soluție. 1. Fie $(x_n)_{n \geq 2}$: $x_n = a$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{a} = 1$, deci de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

2. Fie $(x_n)_{n \geq 2}$: $x_n = n$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, deci de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Convergența și divergența șirului $(a_n)_{n \geq 0}$: $a_n = l^n$, pentru care raportul $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ are valoarea constantă $l \in [0, \infty)$, a fost discutată anterior. În cele ce urmează, vom observa că un șir cu termeni strict pozitivi $(x_n)_{n \geq 0}$ pentru care raportul $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ are limita l , fără a fi neapărat constant, are aceeași convergență sau divergență cu $(a_n)_{n \geq 0}$, cu excepția eventuală a cazului în care $l = 1$.

Teorema 2.42. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir cu termeni strict pozitivi. Dacă există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci

1. Dacă $l \in [0, 1)$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
2. Dacă $l \in (1, \infty]$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.
3. Dacă $l = 1$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ nu poate fi precizată a priori cu ajutorul limitei raportului (spunem că este un caz de dubiu).

Exercițiu. Demonstrați că

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$, unde $a > 0$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$, unde $a > 1, k > 0$.

Soluție. 1. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{a^n}{n!}$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} = 0,$$

deci de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

2. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{n^k}{a^n}$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^k}{a^{n+1}}}{\frac{n^k}{a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \in (0, 1),$$

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Cea de-a doua proprietate poate fi exprimată prescurtat prin faptul că funcția exponențială crește mai rapid către $+\infty$ decât funcția putere.

Exercițiu. Determinați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n+2)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n+1)}.$$

Soluție. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n+2)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n+1)}$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n+2) \cdot (2n+4)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n+1) \cdot (3n+4)}}{\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n+2)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+4}{3n+4} = \frac{2}{3} \in (0, 1),$$

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

2.2.10 Teoremele Stolz-Césaro

Teoremele următoare, numite și *Teoremele Stolz-Césaro*, sunt aplicabile limitelor de rapoarte de șiruri de forma $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$, care pot fi reduse la calculul unor limite de rapoarte de șiruri de forma $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$, posibil mai simple, mai ales dacă $(a_n)_{n \geq 0}$

și $(b_n)_{n \geq 0}$ sunt definite cu ajutorul unor sume. Ele sunt denumite respectiv *Teorema Stolz-Césaro pentru cazul de nedeterminare $\frac{0}{0}$* și *Teorema Stolz-Césaro pentru cazul de nedeterminare $\frac{\infty}{\infty}$* pentru a indica situațiile uzuale de aplicabilitate, deși pentru cazul de nedeterminare $\frac{\infty}{\infty}$ numai limita numitorului este cerută în mod explicit a fi $+\infty$.

Teorema Stolz-Césaro pentru cazul de nedeterminare $\frac{\infty}{\infty}$

Teorema 2.43. Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ și $(b_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale astfel încât

1. $(b_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător și $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

2. Există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$.

Exercițiu. Determinați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}}.$$

Soluție. Fie

$$(a_n)_{n \geq 0} : a_n = 1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}$$

$$(b_n)_{n \geq 0} : b_n = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}$$

Deoarece $b_{n+1} - b_n = \sqrt{n} > 0$, urmează că $(b_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$, urmează că $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. În plus,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{n+1}}{\sqrt{n+1}} = 0,$$

deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. Urmează că de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, deci valoarea limitei din enunț este 0.

Exercițiu. Fie $q \in (0, 1)$. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$.

Soluție. Mai întâi, se observă că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\left(\frac{1}{q}\right)^n}.$$

Fie $(a_n)_{n \geq 0} : a_n = n$, $(b_n)_{n \geq 0} : b_n = \left(\frac{1}{q}\right)^n$. Deoarece $\frac{1}{q} > 1$ iar $b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{q}\right)^n \left(\frac{1}{q} - 1\right) > 0$, urmează că $(b_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător. Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{q}\right)^n = +\infty$, urmează că $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. În plus,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n \left(\frac{1}{q} - 1\right)} = 0.$$

Urmează că de asemenea $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, deci valoarea limitei din enunț este 0.

Teorema Stolz-Césaro pentru cazul de nedeterminare $\frac{0}{0}$

Teorema 2.44. Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ și $(b_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere reale astfel încât

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
2. $(b_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător și $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.
3. Există $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci există și $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$.

2.2.11 Șiruri cu limita numărul e

Vom considera în continuare șirul $(x_n)_{n \geq 0} : x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, căruia îi vom demonstra convergența.

Teorema 2.45. Fie $(x_n)_{n \geq 0} : x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător și mărginit.

Demonstrație. Monotonie

Folosind formula binomială, observăm că

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = 1 + \sum_{k=1}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{n(n-1)\dots(n-(k-1))}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!} \end{aligned}$$

Cu același raționament,

$$x_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) \frac{1}{k!}.$$

Comparând factor cu factor, obținem că

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right),$$

pentru orice $1 \leq k \leq n$, deci $x_n < x_{n+1}$, iar $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător.

Mărginire

Observăm că

$$x_n = 1 + \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!},$$

iar cum

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k \geq 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^{k-1} \text{ pentru } k \geq 2,$$

obținem că

$$\begin{aligned} x_n &\leq 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) \\ &= 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} < 3. \end{aligned}$$

Cum $(x_n)_{n \geq 0}$ este monoton crescător, $x_n \geq x_1 = 2$ pentru orice $n \geq 1$. În concluzie

$$2 \leq x_n < 3 \text{ pentru orice } n \geq 1,$$

deci $(x_n)_{n \geq 0}$ este mărginit.

Fiind monoton și mărginit, $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent. Prin convenție, se notează cu e limita sa, unde $e = 2.71828\dots$ ■

Din teorema de mai sus se obține următoarea egalitate importantă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

De asemenea, se observă că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n-1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right]^{\frac{n}{n-1}}$$

$$= e,$$

deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = e.$$

Teorema 2.46. Șirul $(y_n)_{n \geq 0}$: $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ este strict descrescător și convergent la e .

Demonstrație. Monotonie

Pentru a demonstra că $(y_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător, observăm că

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} &\Leftrightarrow \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} > \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2} \\ &\Leftrightarrow \frac{n+1}{n+2} > \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \Leftrightarrow \sqrt[n+1]{\frac{n+1}{n+2}} > \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$

Aplicând inegalitatea dintre media geometrică și media armonică numerelor $1, 1, \dots, 1, \frac{n+1}{n+2}$, obținem că

$$\sqrt[n+1]{1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{n+2}} > \frac{n+1}{1+1+\dots+1+\frac{n+2}{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{n^2+2n+2}.$$

Rămâne deci să demonstrăm că

$$\frac{(n+1)^2}{n^2+2n+2} \geq \frac{n(n+2)}{(n+1)^2},$$

ceea ce este imediat, deoarece

$$(n^2+2n+2)n(n+2) = [(n+1)^2+1][(n+1)^2-1] = (n+1)^4 - 1 < (n+1)^4.$$

Deoarece $(y_n)_{n \geq 1}$ este strict descrescător, el este mărginit superior de y_1 . Conform inegalității lui Bernoulli,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \geq 1 + (n+1)\frac{1}{n} > 2,$$

deci $(y_n)_{n \geq 1}$ este și mărginit inferior. Cum $(y_n)_{n \geq 1}$ este monoton și mărginit, el este convergent. În plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e,$$

deci $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$. ■

Cum termenii unui șir strict crescător sunt strict mai mici decât valoarea limitei, respectiv termenii unui șir strict descrescător sunt strict mai mari decât valoarea limitei, obținem din cele de mai sus că

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

de unde, prin logaritmare

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

Câteva consecințe importante ale convergenței șirurilor de mai sus, motivate de egalitățile deja obținute, sunt indicate în cele ce urmează.

Teorema 2.47. *Au loc următoarele proprietăți.*

1. Fie $(p_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale strict pozitive cu $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e.$$

2. Fie $(m_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale strict negative cu $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n = -\infty$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n} = e.$$

3. Fie $(z_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale nenule cu $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + z_n)^{\frac{1}{z_n}} = e$.

Exemple.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2n-1}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{2n-1}\right)^{\frac{2n-1}{2}}\right]^{\frac{2}{2n-1}(n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{2n-1}\right)^{\frac{2n-1}{2}}\right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n-1}} = e. \end{aligned}$$

Aici,

$$(z_n)_{n \geq 1} : z_n = \frac{2}{2n-1} \rightarrow 0 \text{ pentru } n \rightarrow \infty.$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - n + 1}{2n^2 + n + 1} \right)^{n+2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2n}{2n^2 + n + 1} \right)^{n+2} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{2n}{2n^2 + n + 1} \right)^{\frac{2n^2 + n + 1}{-2n}} \right]^{\frac{-2n}{2n^2 + n + 1} (n+2)} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{2n}{2n^2 + n + 1} \right)^{\frac{2n^2 + n + 1}{-2n}} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2 - 4n}{2n^2 + n + 1}} \\
&= e^{-1} = \frac{1}{e}.
\end{aligned}$$

Aici,

$$(z_n)_{n \geq 1} : z_n = \frac{2n}{2n^2 + n + 1} \rightarrow 0 \text{ pentru } n \rightarrow \infty.$$

Din Teorema 2.47 se pot deduce de asemenea și următoarele proprietăți.

Teorema 2.48. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale nenule cu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Atunci

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x_n)}{x_n} = 1$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{x_n} - 1}{x_n} = \ln a$ pentru orice $a > 0$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + x_n)^k - 1}{x_n} = k$ pentru orice $k \in \mathbb{R}$.

Exercițiu. Demonstrați că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^k} = 0, \quad k > 0.$$

Soluție. Deoarece $k > 0$, șirul $(b_n)_{n \geq 0}$, $b_n = n^k$, este strict crescător cu limita $+\infty$. Aplicând atunci Teorema 2.43 obținem

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{(n+1)^k - n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1} \frac{1}{n^k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1}{\frac{1}{n}}} \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} n^k} = 1 \cdot \frac{1}{k} \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

Proprietatea poate fi exprimată prescurtat prin faptul că funcția putere crește mai rapid către $+\infty$ decât funcția logaritmică.

Exemple. 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{2} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \ln 2.$$

2.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}{2} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}{2} \right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}} \right]^{\frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}{2} n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}{2} \right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} - 2}} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{2}-1) + (\sqrt[n]{3}-1)}{2} n} \\ &= e^{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \right) \frac{1}{2}} = e^{(\ln 2 + \ln 3) \frac{1}{2}} = e^{\ln \sqrt{2 \cdot 3}} = \sqrt{6}. \end{aligned}$$

Un alt șir cu limita e

Fie acum șirul $(e_n)_{n \geq 1}$ definit prin

$$e_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}.$$

Teorema 2.49. Șirul $(e_n)_{n \geq 0}$ este convergent cu limita e .

Demonstrație. Cum $e_{n+1} - e_n = \frac{1}{(n+1)!}$, $(e_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător, deci $e_n \geq e_1 = 2$ pentru orice $n \geq 1$, iar conform inegalităților obținute în Teorema 2.45, $e_n < 3$ pentru orice $n \geq 1$. În concluzie, $(e_n)_{n \geq 0}$ este mărginit. Fiind și monoton, $(e_n)_{n \geq 0}$ este convergent; să notăm cu e' limita sa. Să notăm de asemenea $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Deoarece $x_n < e_n$, obținem prin trecere la limită pentru $n \rightarrow \infty$ că $e \leq e'$.

Fie acum $1 \leq m < n$ fixat. Atunci

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!} \\ &< 1 + \sum_{k=1}^m \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{1}{k!}. \end{aligned}$$

Trecând la limită pentru $n \rightarrow \infty$ în relația de mai sus, obținem că

$$e \leq 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!},$$

adică $e \leq e_m$. Cum această egalitate este valabilă în fapt pentru orice m (restricția $m < n$ se elimină prin alegerea de la început a unui n suficient de mare), prin trecere la limită se obține că $e \leq e'$. Cum și $e' \leq e$, urmează că $e = e'$, iar $(e_n)_{n \geq 0}$ este convergent tot la e . ■

Din cele de mai sus, se obține următoarea egalitate

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right) = e.$$

Iraționalitatea lui e

Teorema 2.50. Numărul e este irațional.

Constanta lui Euler

Fie acum șirul $(c_n)_{n \geq 1}$ definit prin

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

Teorema 2.51. Șirul $(c_n)_{n \geq 0}$ este convergent.

Demonstrație. Vom demonstra că $(c_n)_{n \geq 0}$ este monoton și mărginit.

Monotonie

Observăm că

$$c_{n+1} - c_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

deci $(c_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător.

Mărginire

Cum $(c_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător, el este mărginit superior. Observăm că

$$\ln(k+1) - \ln k = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) > \frac{1}{k+1}, \text{ pentru } k \geq 1.$$

Sumând inegalitățile obținute pentru $k = 1, k = 2, \dots, k = n - 1$ obținem că

$$\ln n > \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \Leftrightarrow c_n < 1 \text{ pentru } n \geq 2,$$

Cum $(c_n)_{n \geq 0}$ este monoton și mărginit, el este convergent. Prin convenție, se notează cu γ limita sa, unde $\gamma = 0.57721\dots$. Numărul γ astfel definit se numește *constanta lui Euler*. ■

Exercițiu. Determinați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right).$$

Soluție. Au loc relațiile

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln(2n) \right) \\ &\quad - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right) + \ln 2n - \ln n \\ &= c_{2n} - c_n + \ln 2. \end{aligned}$$

Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \gamma$, urmează că limita din enunț este $\ln 2$.

Aplicații

2.1. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \frac{n+2}{2n+5}$. Precizați valorile lui n pentru care $|x_n - \frac{1}{2}| < \frac{1}{9}$.

2.2. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_{n+1} = x_n^2 - 2x_n + 2$, $x_0 = \frac{4}{3}$.

1. Demonstrați că $x_{n+1} - 1 = (x_n - 1)^2$.
2. Determinați expresia termenului general x_n .
3. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.3. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^4 + n^3 + 3n^2 - n + 5}{3n^3 - 2n^2 + n - 6}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n^2 + 2n + 3) - \ln(3n^2 + n - 6));$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 + n + 1)}{\ln(n^6 + 2n + 3)}.$$

2.4. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right)^n + \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} + \left(\frac{2}{3} \right)^{2n+3} \right); \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{5 \cdot 2^{n+1} + 3^{n+2}};$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + n - 1}{3n^2 + 2n + 1} \cdot \left(\frac{3}{5} \right)^n; \quad 4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 0.5 + 0.5^2 + \dots + 0.5^n}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}^2 + \dots + \frac{1}{3}^n}; \quad 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^{n+1} - (\sqrt{5} - \sqrt{3})^{n+1}}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^n - (\sqrt{5} - \sqrt{3})^n}.$$

2.5. Dacă $(x_n)_{n \geq 0}$ este un șir cu proprietatea că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, determinați

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + 2}{2x_n + 3}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 + 2}{3x_n + 1}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + 3}{x_n^3 + 2}.$$

2.6. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n - \sqrt{n}}); \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + (-1)^n}{2n + 3}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+4} - \sqrt{n+3}};$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3 + n} - n).$$

2.7. Folosind eventual un criteriu de majorare-minorare, demonstrați că

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin 1 + 2 \sin 2 + \dots + n \sin n}{n^3} = 0; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} (2n + n \sin \frac{n}{2}) = +\infty;$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + [n] \cos \frac{n\pi}{3}) = -\infty.$$

2.8. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 1}$: $x_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}$. Demonstrați că $0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ pentru orice $n \geq 1$ și determinați de aici $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.9. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 2}$: $x_n = \sqrt[n]{2^n + 3^n}$. Demonstrați că $3 < x_n < 3\sqrt[n]{2}$ pentru orice $n \geq 2$ și determinați de aici $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.10. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 2}$: $x_n = \sqrt[n]{n}$. Se notează $x_n = 1 + \alpha_n$, $n \geq 2$. Demonstrați că $0 < \alpha_n < \sqrt{\frac{2}{n}}$ și determinați de aici $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.11. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 2}$: $x_n = \sqrt[n]{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}$. Demonstrați că $1 < x_n < \sqrt[n]{n^2}$ pentru orice $n \geq 2$ și determinați de aici $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.12. Determinați

$$1. \bigcap_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2n+5}{3n+1} \right], \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2n+1}{3n+2}, \frac{2n+5}{3n+1} \right];$$

$$2. \bigcap_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3n+4}{4n+5}, \frac{3n+8}{4n+9} \right], \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3n+4}{4n+5}, \frac{3n+8}{4n+9} \right].$$

2.13. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+n}{n^2+n+1} \right)^{n+\sqrt{n}}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n+3}{2^n+1} \right)^{n+\ln n}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3\sqrt{n}+5}{2n+5} \right)^{\sqrt{n}}.$$

2.14. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n}.$$

2.15. Determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1\sqrt{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}}.$$

2.16. Folosind eventual una dintre teoremele Stolz-Césaro, determinați valorile următoarelor limite de șiruri:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{n^2(n+1)^2}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 3} + \dots + \frac{1}{\ln n} \right);$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}.$$

2.17. Determinați $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ și $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ în următoarele situații:

$$1. (x_n)_{n \geq 0}: x_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{(-1)^{n^2}}{n^2+1};$$

$$2. (x_n)_{n \geq 0}: x_n = \frac{\sin n^2}{n+1};$$

$$3. (x_n)_{n \geq 0}: x_n = \arcsin(-1)^n + \arccos(-1)^{n+1} + \operatorname{arctg}(-1)^{n+2};$$

$$4. (x_n)_{n \geq 0}: x_n = \left(\frac{n+3}{n} \right)^{n \sin \frac{n\pi}{3}} + \left(\sqrt{n^2 + 3n + 2} - \sqrt{n^2 + 2n + 3} \right)^n.$$

2.18. Fie $(x_n)_{n \geq 0}: x_n = 2 + \frac{n}{n+2} \cos \frac{n\pi}{2}$. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2.19. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ două șiruri de numere pozitive astfel încât $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \neq 0$.

Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup x_n y_n = l \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sup y_n$.

2.20. Determinați valoarea limitei:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^1 \cdot e^2 \cdot \dots \cdot e^n}{n}.$$

2.21. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}: x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1+x_n}$, $n \geq 0$ și $x_0 = 1$.

1. Studiați monotonia și mărginirea șirului $(x_n)_{n \geq 0}$.

2. Demonstrați că șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent și precizați-i limita.

3. Folosind eventual una dintre teoremele Stolz-Césaro, determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$.

2.22. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_{n+1} = \sqrt{3x_n - 2}$, $n \geq 0$ și $x_0 \in (1, 2)$.

1. Demonstrați că $1 < x_n < 2$ pentru orice $n \geq 0$.
2. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător.
3. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent și precizați-i limita.

2.23. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ radicali}}$.

1. Determinați o relație de recurență verificată de termenii șirului $(x_n)_{n \geq 0}$.
2. Demonstrați că $0 < x_n < 2$ pentru orice $n \geq 1$.
3. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător.
4. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent și precizați-i limita.

2.24. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_{n+1} = x_n - x_n^2 + x_n^3$, $n \geq 0$ și $x_0 \in (0, 1)$.

1. Demonstrați că $0 < x_n < 1$ pentru orice $n \geq 0$.
2. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict descrescător.
3. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este convergent și precizați-i limita.

2.25. Fie șirul $(x_n)_{n \geq 0}$: $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n^2}$, $n \geq 0$ și $x_0 > 0$.

1. Demonstrați că $x_n > 0$ pentru orice $n \geq 0$.
2. Demonstrați că $(x_n)_{n \geq 0}$ este strict crescător.
3. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

2.26. Determinați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right).$$

2.27. Dacă un șir monoton $(x_n)_{n \geq 0}$ are un subșir convergent, atunci $(x_n)_{n \geq 0}$ este de asemenea convergent.

2.28. Dacă un șir $(x_n)_{n \geq 0}$ are o infinitate de subșiruri convergente, rezultă că acesta este convergent?

2.29. Fie $(x_n)_{n \geq 0}$ un șir și $l \in \mathbb{R}$. Dacă orice vecinătate V a lui l conține o infinitate de termeni ai șirului $(x_n)_{n \geq 0}$, rezultă că șirul are limita l ?

2.30. Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel ca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4n^2 + 4n + 3} - an - b \right) = 2.$$