

1 Derivabilitate și diferențiabilitate pentru funcții de o variabilă reală

1.1 Derivata și diferențiala unei funcții reale. Proprietăți generale

Definiția 1.1 (i) Fie $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $a \in A' \cap A$. Spunem că f are derivată în punctul a dacă există în \mathbb{R} limita

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (1)$$

Vom nota această limită cu $f'(a)$ și o vom numi **derivata funcției f în punctul a** . Dacă $f'(a) \in \mathbb{R}$, spunem că f este **derivabilă în punctul a** .

(ii) Spunem că funcția $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este **derivabilă pe mulțimea $D \subset A$** , dacă f este derivabilă în fiecare punct din D . Funcția notată f' , $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$, care asociază fiecărui punct $x \in D$ derivata $f'(x)$ se numește **derivata funcției f pe mulțimea D** .

Definiția 1.2 (i) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că f este **diferențiabilă în $a \in I$** dacă există $A \in \mathbb{R}$ și $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$, cu $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$, astfel încât

$$f(x) = f(a) + A(x - a) + \alpha(x)(x - a), \quad (2)$$

pentru orice $x \in I$. În acest caz, aplicația liniară $\mathbb{R} \ni h \mapsto A \cdot h \in \mathbb{R}$ se notează cu $df(a)$ și se numește **diferențiala funcției f în punctul a** .

(ii) Spunem că f este **diferențiabilă pe I** dacă f este diferențiabilă în orice punct $a \in I$.

Observația 1.3 Analizând definiția anterioară, observăm că, în cazul unei funcții f diferențiabile în a , diferența

$$f(x) - f(a)$$

este aproximată local de funcția liniară $A(x - a)$

Teorema 1.4 Dacă $I \subset \mathbb{R}$ este un interval deschis, atunci $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este diferențiabilă în $a \in I$ dacă și numai dacă f este derivabilă în a . În acest caz,

$$df(a)(h) = f'(a) \cdot h, \quad \forall h \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

Demonstrație. “ \Rightarrow ” Presupunem că f este diferențiabilă în punctul $a \in I$. Atunci există $A \in \mathbb{R}$ și $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ cu $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$, astfel încât

$$f(x) = f(a) + A(x - a) + \alpha(x)(x - a),$$

pentru orice $x \in I$. Luând $x \in I \setminus \{a\}$ și împărțind prin $x - a$ avem

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \alpha(x).$$

Obținem existența limitei

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A \in \mathbb{R},$$

adică f este derivabilă în a .

“ \Leftarrow ” Invers, să presupunem că f este derivabilă în a , deci există $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R}$. Fie funcția

$$\alpha(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a), & \text{dacă } x \in I \setminus \{a\} \\ 0, & \text{dacă } x = a. \end{cases}$$

Observăm că $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$ și din definiția lui α avem pentru $x \in I \setminus \{a\}$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a).$$

Evident, egalitatea de mai sus are loc și pentru $x = a$, ceea ce înseamnă că f este diferențiabilă în a și $df(a)(h) = f'(a) \cdot h$. \square

Observația 1.5 Să observăm că, în cazul funcției $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x$, obținem din teorema anterioară că, pentru orice $x \in \mathbb{R}$,

$$dx(h) = dg(x)(h) = g'(x) \cdot h = h, \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

Folosind această relație și (3), vom scrie


$$df(a) = f'(a) \cdot dx \tag{4}$$

ca egalitate de funcții. De asemenea, având în vedere egalitatea anterioară, uneori derivata unei funcții mai este notată și

$$f' = \frac{df}{dx}. \tag{5}$$

Interpretarea geometrică a derivatei și diferențialei

Fie AB dreapta ce trece prin punctele $(x, f(x))$ și $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$. Dacă $A \rightarrow B$, adică $\Delta x \rightarrow 0$, atunci dreapta AB tinde către tangenta dusă în punctul $(x, f(x))$. În concluzie, coeficientul unghiular al tangentei este limita coeficientului unghiular al dreptei AB când Δx tinde la 0 :



$$\operatorname{tg} \alpha = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \operatorname{tg} \beta = f'(x).$$

Figure 1: Interpretarea geometrică derivatei și diferențialei

Deci, derivata poate fi interpretată ca fiind coeficientul unghiular al tangentei dusă în punctul $(x, f(x))$ la graficul funcției $y = f(x)$.

De asemenea, avem că

$$df(x)(\Delta x) = f'(x) \cdot \Delta x.$$

Cu alte cuvinte, graficul diferențialei $df(x)$ este translația tangentei în punctul $(x, f(x))$ la graficul funcției f în origine. Desigur, pentru puncte diferite din domeniul funcției f în care aceasta este derivabilă, tangentele pot avea pante diferite, și implicit translațiile lor în origine. În acest fel, putem observa că diferențiala unei funcții f definește, pentru fiecare punct în care există, câte o aplicație liniară, al cărei grafic este translația tangentei duse în punctul corespunzător la graficul funcției în origine.

Interpretare cinematică a derivatei

Fie M un punct mobil pe Ox care la $t = 0$ pleacă din x_0 și care la momentul t are poziția dată de $x_M = x(t)$. Atunci $\frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{d}{t} = v$, viteza medie în (t_1, t_2) . Când $t_2 \rightarrow t_1$, obținem viteza instantanee la momentul t_1 .

Interpretare fizică a derivatei

Fie o bară neomogenă cu secțiune constantă de arie 1 așezată cu un capăt în O și cu celălalt pe semiaxa pozitivă. Notăm $m(x)$ masa porțiunii dintre O și X . Atunci $m(x_2) - m(x_1)$ reprezintă masa porțiunii AB .

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{S \cdot l} \Rightarrow \rho_{AB} = \frac{m(x_2) - m(x_1)}{1 \cdot (x_2 - x_1)} = \frac{m(x_2) - m(x_1)}{x_2 - x_1}$, densitatea medie a porțiunii AB . Când $x_2 \rightarrow x_1$, obținem densitatea instantanee în x_1 .

Propoziția 1.6 (condiție necesară pentru derivabilitate) *Dacă funcția $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă în punctul $a \in A' \cap A$, atunci f este continuă în a .*

Demonstrație. Pentru $x \in A$, $x \neq a$ are loc egalitatea

$$f(x) = f(a) + \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a).$$

Trecând la limită cu $x \rightarrow a$ și ținând cont de operațiile cu limite de funcții, obținem existența limitei $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ și în plus

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) + f'(a) \cdot 0 = f(a).$$

Obținem deci că f este continuă în a . □

Observația 1.7 *Reciproca propoziției anterioare nu este adevărată. Astfel, funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ este continuă în punctul $x = 0$, dar nu este derivabilă în acest punct.*

Definiția 1.8 (i) *Spunem că funcția $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are derivată la stânga în punctul $a \in A'_s \cap A$ dacă există în \mathbb{R} limita*

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (6)$$

Vom nota această limită cu $f'_s(a)$ și o vom numi derivată la stânga a funcției f în punctul a . Dacă $f'_s(a) \in \mathbb{R}$, vom spune că f este derivabilă la stânga în a .

(ii) Spunem că funcția $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **are derivată la dreapta în punctul** $a \in A'_d \cap A$ dacă există în $\overline{\mathbb{R}}$ limita

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (7)$$

Vom nota această limită cu $f'_d(a)$ și o vom numi **derivata la dreapta** a funcției f în punctul a . Dacă $f'_d(a) \in \mathbb{R}$, vom spune că f este **derivabilă la dreapta în** a .

Teorema 1.9 Funcția $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă în punctul $a \in A'_s \cap A'_d \cap A$ dacă și numai dacă f este derivabilă la stânga și la dreapta în a și $f'_s(a) = f'_d(a)$. În acest caz derivatele laterale sunt egale și cu $f'(a)$.

Propoziția 1.10 (Reguli de calcul pentru derivate) Fie $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ și $a \in A \cap A'$. Dacă f și g sunt derivabile în a , atunci funcțiile $f + g, \alpha f, f \cdot g$ sunt derivabile în a și

$$\begin{aligned} (f + g)'(a) &= f'(a) + g'(a); \\ (\alpha f)'(a) &= \alpha f'(a); \\ (f \cdot g)'(a) &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \end{aligned}$$

Dacă, în plus, $g(a) \neq 0$, atunci funcția $\frac{f}{g}$ este derivabilă în a și

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

Teorema 1.11 (Derivabilitatea funcțiilor compuse) Fie $I, J \subset \mathbb{R}$ intervale. Dacă funcția $f : I \rightarrow J$, este derivabilă în $a \in I$, iar funcția $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă în punctul $b := f(a) \in J$, atunci compusa lor $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă în a și

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Teorema 1.12 (Derivabilitatea funcției inverse) Fie $I, J \subset \mathbb{R}$ intervale și funcția $f : I \rightarrow J$, continuă și bijectivă. Dacă f este derivabilă în $a \in I$ și $f'(a) \neq 0$, atunci funcția inversă $g = f^{-1}$ este derivabilă în $b = f(a) \in J$ și

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Propoziția 1.13 (Reguli de calcul pentru diferențiale) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis și $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$ și $a \in A \cap A'$. Dacă f și g sunt diferențiabile în a , atunci funcțiile $f + g, \alpha f, f \cdot g$ sunt diferențiabile în a și

$$\begin{aligned} d(f + g)(a) &= df(a) + dg(a); \\ d(\alpha f)(a) &= \alpha df(a); \\ d(f \cdot g)(a) &= df(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot dg(a). \end{aligned}$$

Dacă, în plus, $g(a) \neq 0$, atunci funcția $\frac{f}{g}$ este diferențiabilă în a și

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{df(a)g(a) - f(a)dg(a)}{g^2(a)}.$$

Teorema 1.14 (Diferențiala funcțiilor compuse) Fie $I, J \subset \mathbb{R}$ intervale. Dacă funcția $f : I \rightarrow J$, este diferentiabilă în $a \in I$, iar funcția $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ este diferentiabilă în punctul $b := f(a) \in J$, atunci compusa lor $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este diferentiabilă în a și

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a). \quad (8)$$

Tabel cu derivatele funcțiilor elementare

Funcția f	Derivata f'	Funcția f	Derivata f'
1. c	0	10. $\sin x$	$\cos x$
2. x	1	11. $\cos x$	$-\sin x$
3. $x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$	12. $\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
4. \sqrt{x} ,	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	13. $\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
5. $\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	14. $\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
6. $a^x, a > 0$	$a^x \ln a$	15. $\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. e^x	e^x	16. $\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{x^2+1}$
8. $\log_a x, a > 0$	$\frac{1}{x \ln a}$	17. $\operatorname{arcctg} x$	$-\frac{1}{x^2+1}$
9. $\ln x$	$\frac{1}{x}$		

1.2 Teoremele fundamentale ale calculului diferențial real

Definiția 1.15 Fie $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că $a \in A$ este:

(i) **punct de minim local** pentru f dacă există o vecinătate V a punctului a astfel încât $f(a) \leq f(x)$, pentru orice $x \in A \cap V$;

(ii) **punct de maxim local** pentru f dacă există o vecinătate V a punctului a astfel încât $f(a) \geq f(x)$, pentru orice $x \in A \cap V$;

(iii) **punct de extrem local** pentru f dacă e punct de minim sau de maxim local;

(iv) **punct de minim global** pentru f dacă $f(a) \leq f(x)$, pentru orice $x \in A$;

(v) **punct de maxim global** pentru f dacă $f(a) \geq f(x)$, pentru orice $x \in A$;

(vi) **punct de extrem global** pentru f dacă e punct de minim sau de maxim global.

Observăm imediat că orice punct de minim (respectiv, maxim) global este punct de minim (respectiv, maxim) local, dar reciproca nu este adevărată.

Teorema 1.16 (Fermat) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval și $a \in \overset{\circ}{I}$. Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă în a , iar a este punct de extrem local pentru f , atunci $f'(a) = 0$.

Demonstrație. Să presupunem că a este punct de minim local. Există o vecinătate V a lui a astfel încât pentru orice $x \in V \cap A$ să aibă loc $f(a) \leq f(x)$. Cum $a \in \overset{\circ}{I}$, putem presupune ca $V \subset A$. Deci dacă $x \in V$, $x < a$, fracția $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ este pozitivă, iar dacă $x \in V$, $x > a$, fracția este negativă. Prin trecere la limită în fiecare caz în parte, obținem $f'_s(a) \leq 0$ și $f'_d(a) \geq 0$. Cum f este derivabilă în a , cele două derivate laterale sunt egale, deci sunt egale cu 0. \square

Observația 1.17 1. Reciproca teoremei lui Fermat nu este adevărată: de exemplu derivata funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ se anulează în 0 fără ca acest punct să fie punct de extrem.

2. Condiția ca a să fie interior intervalului I este esențială, adică în lipsa acestei ipoteze concluzia nu se mai păstrează: de exemplu $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $f(x) = x$ are în $a = 0$ un punct de minim în care derivata nu se anulează.

3. Teorema lui Fermat precizează condiții necesare pentru ca un punct să fie de extrem local. Așa cum am văzut mai sus, aceste condiții nu sunt și suficiente. Deci, în aplicații, rezolvând ecuația $f'(x) = 0$ obținem așa-numitele **puncte critice**, care sunt candidații pentru punctele de extrem. Pentru a decide dacă un punct critic este și punct de extrem trebuie studiată variația funcției în jurul respectivului punct (a se vedea consecințele Teoremei lui Lagrange de mai jos).

Teorema 1.18 (Rolle) Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ și $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) astfel încât $f(a) = f(b)$. Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât $f'(c) = 0$.

Demonstrație. Dacă f este constantă pe $[a, b]$, atunci $f'(c) = 0$ pentru orice $c \in (a, b)$, deci are loc concluzia. Presupunem că f nu este constantă. Cum f este continuă pe mulțimea compactă $[a, b]$, este mărginită și își atinge marginile conform Teoremei lui Weierstrass. Fie $\alpha, \beta \in [a, b]$ astfel încât

$$f(\alpha) = \inf\{f(x) \mid x \in [a, b]\} \text{ și} \\ f(\beta) = \sup\{f(x) \mid x \in [a, b]\}.$$

Este clar că $f(\alpha) < f(\beta)$ și deci că nu putem avea simultan $\alpha = a$ și $\beta = b$ (prin ipoteză, $f(a) = f(b)$). Există așadar un punct de extrem local (chiar global) în interiorul intervalului $[a, b]$ și f este derivabilă în acel punct. Utilizând Teorema lui Fermat, rezultă concluzia. \square

O funcție $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietățile că este continuă pe $[a, b]$ și derivabilă pe (a, b) se mai numește **funcție Rolle**.

Trecem la un rezultat, foarte important în special datorită consecințelor sale.

Teorema 1.19 (Lagrange) Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ și $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) . Atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Demonstrație. Considerăm funcția auxiliară $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de forma

$$g(x) = f(x) + \frac{f(a) - f(b)}{b - a}x.$$

Funcția g satisface ipotezele Teoremei lui Rolle și deci există $c \in (a, b)$ astfel încât $g'(c) = 0$. Obținem

$$f'(c) + \frac{f(a) - f(b)}{b - a} = 0,$$

de unde concluzia. \square

Observația 1.20 Dacă adăugăm condiția $f(a) = f(b)$, obținem din Teorema lui Lagrange concluzia Teoremei lui Rolle. Așadar, cum demonstrația Teoremei lui Lagrange s-a bazat pe Teorema lui Rolle, deducem că aceste două rezultate sunt, de fapt, echivalente.

Observația 1.21 Interpretatea geometrică a Teoremei lui Lagrange este următoarea: dacă f satisface condițiile precizate, atunci există cel puțin un punct c interior intervalului $[a, b]$ pentru care tangenta la graficul funcției în $(c, f(c))$ este paralelă (sau coincide) cu dreapta determinată de punctele $(a, f(a))$ și $(b, f(b))$.

O generalizare a Teoremei lui Lagrange este următoarea.

Teorema 1.22 (Cauchy) Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ și $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt două funcții continue pe $[a, b]$, derivabile pe (a, b) astfel încât $g'(x) \neq 0$, pentru orice $x \in (a, b)$. Atunci $g(b) - g(a) \neq 0$ și există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Observația 1.23 Teorema lui Lagrange se poate obține din Teorema lui Cauchy pentru $g(x) = x$.

Următoarele consecințe ale Teoremei lui Lagrange sunt importante, deschizând calea studiului monotoniei funcțiilor prin intermediul derivatelor.

Propoziția 1.24 (Consecințele Teoremei lui Lagrange) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval și $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, derivabilă pe I .

- (i) Dacă $f'(x) = 0$ pentru orice $x \in I$, atunci f este constantă pe I .
- (ii) Dacă $f'(x) > 0$ pentru orice $x \in I$, atunci f este strict crescătoare pe I .
- (iii) Dacă $f'(x) \geq 0$ pentru orice $x \in I$, atunci f este crescătoare pe I .
- (iv) Dacă $f'(x) < 0$ pentru orice $x \in I$, atunci f este strict descrescătoare pe I .
- (v) Dacă $f'(x) \leq 0$ pentru orice $x \in I$, atunci f este descrescătoare.

Demonstrație. (i) Fixăm $a \in I$ și luăm $x \in I$ arbitrar. Aplicând Teorema lui Lagrange pe intervalul de capete a și x deducem că există c astfel încât $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a)$. Cum $f'(c) = 0$, vom avea că $f(x) = f(a)$ și deci f este constantă pe I .

(ii) Fie $x_1, x_2 \in I$ cu $x_1 < x_2$. Conform Teoremei lui Lagrange, există $c \in (x_1, x_2)$ astfel încât $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$. Cum $f'(c) > 0$ și $x_2 > x_1$, deducem că $f(x_2) > f(x_1)$. Rezultă f strict crescătoare pe I .

Celelalte cazuri se demonstrează similar. □

Observația 1.25 Evident reciproca afirmației de la (i) este adevărată.

În celelalte cazuri sunt adevărate reciprocele doar pentru monotonie nestrictă (și inegalități nestrictă). Stricta monotonie nu implică în general stricta pozitivitate a derivatei din cauza faptului că, prin trecere la limită, inegalitățile stricte nu se păstrează între limite.

De exemplu funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ este strict crescătoare pe \mathbb{R} , dar derivata sa se anulează în 0.

Următoarea consecință a Teoremei lui Lagrange poate fi utilă uneori în studiul derivabilității funcțiilor.

Propoziția 1.26 Fie $I \subset \mathbb{R}$, un interval, $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, f continuă. Dacă f este derivabilă pe $I \setminus \{a\}$ și există $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ (finită sau infinită), atunci există derivata funcției f în a , $f'(a)$, și

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x).$$

Demonstrație. Fie $(x_n) \subset I \setminus \{a\}$ un șir descrescător cu limita a . Aplicăm Teorema lui Lagrange pe intervalul $[a, x_n]$. Există atunci $c_n \in (a, x_n)$ astfel încât

$$f'(c_n) = \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a}.$$

Cum $x_n \rightarrow a$, va rezulta că $c_n \rightarrow a$. Deoarece există limita $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, va rezulta folosind caracterizarea cu șiruri a limitei că $f'(c_n) \rightarrow \ell$. Rezultă, folosind caracterizarea cu șiruri a limitei la stânga, că există

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_s(a) = \ell.$$

Analog se arată că există $f'_d(a) = \ell$. Propoziția este demonstrată. \square

Exemplul 1.27 Să aplicăm propoziția anterioară la studiul derivabilității funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{dacă } x < 0 \\ x^3, & \text{dacă } x \geq 0. \end{cases}$$

Observăm că f este derivabilă pe $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ca funcție elementară și că

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & \text{dacă } x < 0 \\ 3x^2, & \text{dacă } x > 0. \end{cases}$$

De asemenea, există $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f'(x) = 0 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f'(x)$, deci $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$. Rezultă conform propoziției precedente că există $f'(0) = 0$, deci f este derivabilă în 0 , deci pe \mathbb{R} .

Observația 1.28 Conform rezultatului precedent, dacă există și este finită $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$, atunci f este derivabilă în a și funcția derivată este continuă în a .

Propoziția de mai sus precizează condiții suficiente, dar nu și necesare pentru existența derivatei în a . De exemplu, funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{dacă } x \neq 0 \\ 0, & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

este derivabilă conform definiției în $x = 0$. Într-adevăr,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Calculând derivata funcției f pentru $x \neq 0$, avem

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

deci nu există $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$. Așadar, nu putem aplica Propoziția 1.26 pentru a deduce derivabilitatea funcției f în 0 .

Observația 1.29 În general, derivata unei funcții derivabile nu este continuă. De exemplu, am arătat mai sus că funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{dacă } x \neq 0 \\ 0, & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

este derivabilă pe \mathbb{R} , dar

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & \text{dacă } x \neq 0 \\ 0, & \text{dacă } x = 0 \end{cases}$$

nu este continuă în 0.

Teorema 1.30 (Regula lui L'Hôpital) Fie $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, unde $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Dacă:

(i) f, g sunt derivabile pe (a, b) cu $g' \neq 0$ pe (a, b) ;

(ii) există $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$;

(iii) $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = 0$ sau (iii)' $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = \infty$,

atunci există

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L. \quad (9)$$

Observația 1.31 1. Teorema anterioară se poate reformula, având demonstrații foarte asemănătoare, considerând $\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}}$ în loc de $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}}$, sau punând în loc de (iii)', una din ipotezele

(iii)'' $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} g(x) = -\infty$, respectiv

(iii)''' $\lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}} g(x) = -\infty$.

Dacă, în plus, punctul a considerat în Teorema lui L'Hôpital este punct de acumulare pentru domeniile funcțiilor f, g (și nu doar punct de acumulare la dreapta), combinând teorema în forma prezentată și observația anterioară pentru $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}}$, are loc Regula lui L'Hôpital pentru $\lim_{x \rightarrow a}$.

2. Reciproca Teoremei lui L'Hôpital nu este adevărată: considerăm funcțiile $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ date prin

$$f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} \text{ și } g(x) = x.$$

Atunci

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

însă

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

nu are limită în $x = 0$. Așadar, există $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, dar nu există $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

1.2.1 Limite fundamentale. Eliminarea nedeterminărilor

Să remarcăm faptul că Teorema lui L'Hôpital oferă un instrument puternic de eliminare a nedeterminărilor în cazul calculului limitelor de funcții. Următoarele limite sunt considerate fundamentale:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(i)} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; & \text{(ii)} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e; & \text{(iii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \\
 \text{(iv)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, a > 0; & \text{(v)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; & \text{(vi)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1; \\
 \text{(vii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1; & \text{(viii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1; & \text{(ix)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0; \\
 \text{(x)} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{a^x} = 0, n \in \mathbb{N}, a > 1. & \text{(xi)} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = +\infty; & \text{(x)} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty; \\
 \text{(xi)} \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}; & \text{(xii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}; & \text{(xiii)} \lim_{\substack{x \rightarrow \pi/2 \\ x < \pi/2}} \operatorname{tg} x = +\infty; \\
 \text{(xiv)} \lim_{\substack{x \rightarrow \pi/2 \\ x > \pi/2}} \operatorname{tg} x = -\infty. & &
 \end{array}$$

Eliminarea nedeterminărilor se face, de obicei, astfel:

(i) Cazurile $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ se elimină fie folosind limitele fundamentale, fie cu Regula lui L'Hôpital.

(ii) Cazurile $0 \cdot \infty, 0 \cdot (-\infty)$ se reduc la cazurile $\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ astfel: fie $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}, a \in A'$, astfel încât există $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty(-\infty)$ și există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0, \forall x \in U \setminus \{a\}$; putem scrie $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ și astfel nedeterminarea dată se reduce la o nedeterminare $\frac{0}{0}$ sau $f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$ și vom obține o nedeterminare de tip $\frac{\infty}{\infty}$.

(iii) Cazul $\infty - \infty$ se reduce, de obicei, la cazul $0 \cdot \infty$ astfel: fie $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}, a \in A'$, astfel încât există $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ și există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) \neq 0, \forall x \in U \setminus \{a\}$; putem scrie $(f(x) - g(x)) = f(x) \left(1 - \frac{g(x)}{f(x)}\right)$. Dacă $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$, atunci nedeterminarea dată se reduce la o nedeterminare $0 \cdot \infty$; dacă $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} > 1 (< 1)$, atunci $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = -\infty (+\infty)$.

(iv) Cazurile $0^0, \infty^0$ se reduc la cazul $0 \cdot \infty$ astfel: fie $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}, a \in A'$, astfel încât există $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 (+\infty), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ și există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) > 0, \forall x \in U \cap A \setminus \{a\}$. Putem scrie $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$ și limita de la exponent este o nedeterminare de tip $0 \cdot (-\infty)$ (respectiv $0 \cdot \infty$).

(v) Cazul 1^∞ se reduce tot la cazul $0 \cdot \infty$ fie prin metoda de la punctul iv), fie astfel: dacă $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}, a \in A'$, astfel încât există $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ și există $U \in \mathcal{V}(a)$ astfel încât $f(x) \neq 1, \forall x \in U \setminus \{a\}$, atunci vom scrie $f(x)^{g(x)} = \left\{ \left[1 + (f(x) - 1) \right]^{\frac{1}{f(x)-1}} \right\}^{g(x)(f(x)-1)}$. Avem $\lim_{x \rightarrow a} \left[1 + (f(x) - 1) \right]^{\frac{1}{f(x)-1}} = e$, iar $\lim_{x \rightarrow a} g(x)(f(x) - 1)$ este o nedeterminare de tip $0 \cdot \infty$.

1.3 Derivate și diferențiale de ordin superior. Formula lui Taylor

După cum am văzut în secțiunea anterioară, în cazul unei funcții reale f , derivabilă (sau, echivalent, diferențiabilă) într-un punct a , valorile funcției într-o vecinătate a lui a pot fi aproximare prin $f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$. Pe parcursul acestei secțiuni vom arăta că acest tip de aproximare se poate rafina în cazul funcțiilor derivabile de ordin mai mare decât unu. În acest scop, să dăm pentru început câteva definiții.

Definiția 1.32 Fie $A \subset \mathbb{R}$, o mulțime deschisă.

(i) Spunem că funcția $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ este **derivabilă de două ori în punctul** $a \in A$ (respectiv pe A) dacă f este derivabilă într-o vecinătate a punctului a și funcția derivată f' este derivabilă în a (respectiv pe A). În acest caz, derivata lui f' în a se numește **derivata a doua a lui f în a** și se notează $f''(a)$, sau $f^{(2)}(a)$.

(ii) Spunem că funcția $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ este **diferențiabilă de ordinul al doilea în punctul** $a \in A$, dacă f este derivabilă într-o vecinătate a punctului a și funcția derivată f' este diferențiabilă în a . În acest caz, funcția $d^2 f(a) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dată prin

$$d^2 f(a) = f''(a)(dx)^2 = f''(a)dx^2$$

sau, echivalent, prin

$$d^2 f(a)(h) = f''(a) \cdot h^2, \forall h \in \mathbb{R}$$

se numește **diferențiala a doua a lui f în a** .

Să observăm că, potrivit Teoremei 1.4 aplicată funcției f' , o funcție este de două ori derivabilă în punctul a (respectiv pe A) dacă și numai dacă este diferențiabilă de ordinul al doilea în a (respectiv pe A).

Definiția 1.33 Fie $A \subset \mathbb{R}$, o mulțime deschisă, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

(i) Spunem că f este **de n ori derivabilă în** $a \in A$ (respectiv pe A) dacă $f^{(n-1)}$ este derivabilă într-o vecinătate a punctului a și funcția derivată $f^{(n-1)}$ este derivabilă în a . În acest caz, derivata lui $f^{(n-1)}$ în a se numește **derivata de ordin n a lui f în a** și se notează $f^{(n)}(a)$.

(ii) Spunem că f este **de n ori diferențiabilă în** $a \in A$ (respectiv pe A) dacă $f^{(n-1)}$ este derivabilă într-o vecinătate a punctului a și funcția derivată $f^{(n-1)}$ este diferențiabilă în a (respectiv pe A). În acest caz, funcția $d^n f(a) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dată prin

$$d^n f(a) = f^{(n)}(a)(dx)^n = f^{(n)}(a)dx^n$$

sau, echivalent, prin

$$d^n f(a)(h) = f^{(n)}(a) \cdot h^n, \forall h \in \mathbb{R}$$

se numește **diferențiala de ordinul n a lui f în a** .

Definiția 1.34 Fie $D \subset \mathbb{R}$ o mulțime deschisă și $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că f este **de clasă C^n pe D** ($n \in \mathbb{N}^*$) dacă f este de n ori derivabilă pe D , iar derivata de ordin n , $f^{(n)}$, este continuă pe D . Notăm

$$C^n(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ este de clasă } C^n \text{ pe } A\}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

și, prin convenție,

$$C^0(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă pe } A\}.$$

De asemenea, vom nota prin convenție $f^{(0)} = f$.

Spunem că f este de clasă C^∞ pe D dacă f este derivabilă de orice ordin pe D . Vom nota

$$C^\infty(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ este de clasă } C^\infty \text{ pe } A\}.$$

Teorema 1.35 (Formula lui Leibniz) Fie $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ de n ori derivabile în $a \in A$. Atunci $f \cdot g$ este de n ori derivabilă în a și are loc formula

$$(f \cdot g)^{(n)}(a) = \sum_{i=0}^n C_n^i f^{(i)}(a) g^{(n-i)}(a). \quad (10)$$

Demonstrație. Prin inducție. □

Formula lui Taylor

Fie

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

un polinom de grad n cu coeficienți reali ($a_n \neq 0$ și $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1, n}$). Dorim pentru început să arătăm că putem scrie polinomul de mai sus în mod unic în forma

$$P(x) = A_0 + A_1(x - a) + \dots + A_n(x - a)^n$$

pentru un $a \in \mathbb{R}$ fixat. Un mod de a arăta acest lucru este următorul. Este clar că termenul liber A_0 este egal cu $P(a)$. Mai departe, prin derivare, obținem

$$P'(x) = A_1 + 2A_2(x - a) + \dots + A_n(x - a)^{n-1},$$

de unde $A_1 = P'(a)$. În mod analog, derivând în continuare, obținem

$$A_k = \frac{1}{k!} P^{(k)}(a), \text{ pentru } k = \overline{1, n}.$$

Asadar,

$$P(x) = P(a) + \frac{1}{1!} P'(a)(x - a) + \dots + \frac{1}{n!} P^{(n)}(a)(x - a)^n.$$

Dorim acum să extindem formula precedentă la situația mai generală când în locul polinomului P avem o funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, unde $I \subset \mathbb{R}$ este un interval deschis. Vom numi polinomul

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

polinomul Taylor de ordin n asociat funcției f în punctul a .

Problema care se pune este în ce măsură acest polinom aproximează funcția f . Am văzut că în cazul în care f este un polinom de grad mai mic sau egal cu n , atunci $T_n = f$. Să notăm

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

pentru orice $x \in I$. Tocmai comportarea lui R_n măsoară gradul de aproximare al funcției f prin polinomul Taylor.

Teorema 1.36 (Formula lui Taylor cu restul lui Peano) Fie $I \subset \mathbb{R}$, un interval deschis și $n \in \mathbb{N}^*$. Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de n ori derivabilă în $a \in I$, atunci există o funcție $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \alpha(a) = 0$, astfel încât

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \alpha(x) \frac{(x-a)^n}{n!},$$

pentru orice $x \in I$.

Teorema 1.37 (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis, $a \in I$ și $n \in \mathbb{N}$. Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de $(n+1)$ ori derivabilă pe I , atunci pentru orice $x \in I$, $x \neq a$ există $c \in (x, a)$ sau $c \in (a, x)$ astfel încât

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}.$$

Demonstrație. Să căutăm restul de forma

$$R_n(x) = A(x-a)^{n+1}, \quad x \in I.$$

Fie funcția $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ dată prin

$$\varphi(t) = f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n + A \cdot (x-t)^{n+1}.$$

Funcția φ este derivabilă pe I și $\varphi(x) = f(x)$ iar $\varphi(a) = T_n(x) + R_n(x) = f(x)$. Suntem în condițiile teoremei lui Rolle pe $[a, x]$ sau $[x, a]$ și deci există $c \in (a, x)$ sau $c \in (x, a)$ astfel încât $\varphi'(c) = 0$. Dar

$$\varphi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} \cdot (x-t)^n - A(n+1)(x-t)^n$$

pentru orice $t \in I$. Cum $c \neq x$, obținem

$$A = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

de unde rezultă concluzia. □

Particularizând $a = 0$ se obține formula lui MacLaurin.

Propoziția 1.38 (Formula lui MacLaurin) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis, $0 \in I$ și $n \in \mathbb{N}$. Dacă $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție de $(n+1)$ ori derivabilă pe I , atunci pentru orice $x \in I$, $x \neq 0$ există $c \in (x, 0)$ sau $c \in (0, x)$ astfel încât

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot x^{n+1}.$$

Exemplul 1.39 În formula lui MacLaurin, cum $c \in (x, 0)$ sau $c \in (0, x)$ putem să luăm c de forma $c = \theta x$ unde $\theta \in (0, 1)$. Astfel se obțin dezvoltările de mai jos.

1. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Această funcție este de clasă C^∞ și scriind formula lui MacLaurin cu restul de ordin n obținem că pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există $\theta \in (0, 1)$ astfel încât

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x}.$$

2. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. Această funcție este de clasă C^∞ și pentru orice $n \in \mathbb{N}$ are loc $f^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$. Scriind formula MacLaurin de ordin $2n + 1$ avem pentru orice $x \in \mathbb{R}$ un $\theta \in (0, 1)$ astfel încât

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \sin \theta x.$$

Analog, pentru $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos x$ obținem pentru orice $x \in \mathbb{R}$ un $\theta \in (0, 1)$ astfel încât

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cos \theta x.$$

3. Fie $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x + 1)$. Are loc dezvoltarea

$$\ln(x + 1) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \frac{1}{(1 + \theta x)^{n+1}}$$

pentru orice $x \in (-1, \infty)$, unde $\theta \in (0, 1)$.

Formulele de mai sus pot fi folosite pentru determinarea unor limite. Exemplificăm cu următorul exercițiu.

Exercițiul 1.40 Pentru ce valori ale lui $n \in \mathbb{N}$ există, este finită și nenulă limita

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \sin x^3 + x^3(x^6 - 6)}{x^n} ?$$

Conform teoriei de mai sus, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există $\theta_x \in (0, 1)$ astfel încât

$$\sin x^3 = x^3 - \frac{x^9}{6} + \frac{x^{15}}{120} - \frac{x^{18}}{720} \sin \theta_x x.$$

Înlocuind în limita de mai sus obținem $n = 15$ și valoarea limitei $\frac{1}{20}$.

De asemenea, derivatele de ordin superior pot fi utile în determinarea punctelor de extrem.

Teorema 1.41 (Puncte de extrem) Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de n ori derivabilă în $a \in I$, ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$), astfel încât

$$f'(a) = 0, f''(a) = 0, \dots, f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0. \quad (11)$$

(i) Dacă n este par, atunci a este punct de extrem, mai exact: punct de maxim local dacă $f^{(n)}(a) < 0$ și punct de minim local dacă $f^{(n)}(a) > 0$.

(ii) Dacă n este impar, atunci a nu este punct de extrem.

Corolarul 1.42 Fie $I \subset \mathbb{R}$ un interval deschis, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de 2 ori derivabilă în $a \in I$, astfel încât

$$f'(a) = 0, f''(a) \neq 0. \quad (12)$$

Dacă $f''(a) < 0$ atunci a este punct de maxim local, iar dacă $f''(a) > 0$ atunci a este punct de minim local.

Exemplul 1.43 Să analizăm punctele de extrem ale funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \sin x + \cos x.$$

Cum această funcție este periodică de perioadă principală 2π , este suficient să-i analizăm comportarea pe intervalul $[0, 2\pi)$. Funcția este în mod evident de clasă C^∞ pe \mathbb{R} . Mai mult,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x - \sin x, \\ f''(x) &= -\sin x - \cos x. \end{aligned}$$

Rezolvând ecuația $f'(x) = 0$ pe intervalul $[0, 2\pi)$, găsim soluțiile $x_1 = \frac{\pi}{4}$ și $x_2 = \frac{5\pi}{4}$. Calculând valorile derivatei a doua, obținem $f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} < 0$ și $f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2} > 0$. Folosind teorema anterioară, deducem că $\frac{\pi}{4}$ este punct de maxim local pentru f , cu $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, iar $\frac{5\pi}{4}$ este punct de minim local pentru f , cu $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$. Mai mult, pentru că $\frac{\pi}{4}$ este singurul punct de maxim pentru f din intervalul $[0, 2\pi)$, deducem că este punct de maxim global pentru f . Analog, $\frac{5\pi}{4}$ este punct de minim global.

Folosind periodicitatea funcției, deducem că punctele de forma $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ sunt punctele de maxim global pentru f , iar punctele de forma $\frac{5\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ sunt punctele de minim global pentru f .

Observația 1.44 În exemplul anterior, a fost folosit testul de semn al derivatei a doua în cazul punctelor critice ale funcției f . Acest aspect se va generaliza la cazul funcțiilor reale de variabilă vectorială pentru a determina punctele de minim/maxim, folosind pozitivă/negativă definire a diferențialei de ordinul al doilea, după cum se va vedea în capitolul următor.